

こんな雑草、見たことない！！

—最近の大豆畑は外来雑草の宝庫—



最近、外来雑草が大繁茂している大豆畑がしばしば見られます。油断すると収穫皆無になってしまいます。

上のような畑は収穫できない！



○代表的な難防除外来雑草と大豆バサグランの効果

ホオズキ類



ヒロハフウリンホオズキ



センナリホオズキ

大豆バサグラン
の効果は低い

アサガオ類



マルバルコウ

効果高い



マメアサガオ

効果中程度



アメリカアサガオ

効果低い

難防除雑草の蔓延防止のためには・・・

- 好条件で播種し、欠株が少なくて生育の良い大豆を作る
- 2種類以上の成分が入った土壤処理剤を散布する
- 大豆バサグラン液剤を散布する（効果が低いこともある）
- 必要に応じてバスタまたはハービー液剤の畦間処理、手取り除草を行う
- 機械をよく掃除し、未発生圃場への種子の持ち込みを防ぐ

有効な手段を組み合わせ、総合的な防除を行うことが重要です

大豆バサグラン液剤の使用基準

使用時期・回数：大豆の2葉期～開花前
(収穫45日前まで、1回)

使用量：100～150mℓ/10a（希釈水量100ℓ/10a）

(問い合わせ先)

作物研究室 研究員 福見尚哉

電話 0857-53-0721

本書から転載・複製する場合は、必ず鳥取県
農業試験場の許可を受けてください。