

地大豆ブランド品種の生産安定！

すっきり『剪定（せんてい）』♪倒れず『増収』♪
～剪葉摘心（せんようてきしん）技術の効果～

生育途中に茎と葉をバリカンで剪定（せんてい）します♪



剪定（せんてい）効果で…
過繁茂防止!!

茎が短くなるので…
倒伏抑制!!

摘心（てきしん）効果で…
分枝さやで増収!!

収量は増えて…
品質・成分そのまま!!



条間30～45cmの密播無培土栽培でも効果があります！




剪葉摘心処理後は、地表に光が入って、一時的に雑草が生育しやすい期間があるので、**雑草防除を徹底**しましょう！




ほ場排水や病虫害防除を徹底し、**生育量を確保**しましょう！

【剪葉摘心技術による効果 (播種後40~50日、主茎先端より2節程度を切断)】


第1図. 増収および倒伏軽減




第2図. 分枝節およびさや数増加 (密播無培土体系・緑だんだん)



第3図. 蔓化 (まんか) の抑制 (密播無培土体系)



第4図. 品質および成分の維持 (密播無培土体系)



(問い合わせ先)
鳥取県農業試験場 作物研究室
TEL 0857(53)0721

※本書から転載複製する場合には必ず農業試験場の許可を受けてください。

