





図 フェロモントラップにおけるハマキムシ類の誘殺消長(北栄町、園試)

【チャノコカクモンハマキ】

月	3			4			5			6			7			8			9			10		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
本年	0	0	0	0	7	25	57	54	5	0	8	28	18	3	3	37	18	8	18	56	55	63	33	15
平年(H27～R6)	0.5	1.9	2.8	2.4	9.7	18.3	46.4	23.7	3.2	2.0	8.4	25.8	25.5	3.6	7.8	12.8	9.5	5.4	7.1	25.2	43.4	43.9	22.9	17.2

【チャハマキ】

月	3			4			5			6			7			8			9			10		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
本年	0	0	0	0	2	1	4	6	2	1	0	0	0	11	1	2	1	0	0	0	5	6	8	11
平年(H27～R6)	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	3.8	5.7	5.4	2.9	0.5	0.2	0.9	2.0	1.6	1.8	0.4	0.9	3.0	1.4	1.1	2.5	4.2	9.5	8.7