

チャノキイロアザミウマのフェロモントラップ調査結果(ブドウ、園試砂丘地研究センター調査)

鳥取県病害虫防除所

令和8年5月上旬現在




図2 黄色粘着板におけるチャノキイロアザミウマの誘殺消長

【チャノキイロアザミウマ (砂丘研露地)】

| 月 旬 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平年(H27-R6) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 4.6 | 10.6 | 14.6 | 40.7 | 37.8 | 46.5 | 34.3 | 27.4 | 23.8 | 6.6 | 0.4 | 0.3 |

【チャノキイロアザミウマ (砂丘研無加温)】

| 月 旬 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平年(H27-R6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 7.8 | 34.5 | 182.7 | 125.1 | 101.2 | 110.1 | 87.7 | 52.1 | 22.9 | 4.3 | 1.0 | 0.0 |