

チャノキイロアザミウマのフェロモントラップ調査結果(ブドウ、園試砂丘地研究センター調査)

鳥取県病害虫防除所

令和7年8月下旬現在





図2 黄色粘着板におけるチャノキイロアザミウマの誘殺消長

【チャノキイロアザミウマ (砂丘研露地)】

月	4			5			6			7			8			9			10		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
本年	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	3	4						
平年(H27-R6)	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.4	0.5	0.7	4.2	4.8	24.1	39.0	61.0	56.1	52.7	39.4	29.6	24.4	6.6	0.4	0.3

【チャノキイロアザミウマ (砂丘研無加温)】

月	4			5			6			7			8			9			10		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
本年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	11	21	20						
平年(H27-R6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.7	0.9	1.5	8.2	36.1	186.4	128.0	99.7	108.4	83.9	48.1	22.3	4.2	1.1	0.0