

チャノコカクモンハマキの誘殺消長(ブドウ、園試砂丘地研究センター調査)

鳥取県病害虫防除所

令和7年6月中旬現在





図1 フェロモントラップにおけるチャノコカクモンハマキの誘殺消長

【チャノコカクモンハマキ (砂丘研露地)】

月	4			5			6			7			8			9			10			11		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
本年	1	13	82	86	78	16	5	40																
平年(H27-R6)	11.0	42.1	62.9	63.2	32.8	7.2	3.6	42.7	54.1	30.6	14.0	35.7	40.8	21.8	15.7	30.2	63.2	72.6	66.4	43.4	28.1	20.6	5.8	3.6

【チャノコカクモンハマキ (砂丘研無加温)】

月	4			5			6			7			8			9			10			11		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
本年	0	1	2	1	19	1	1	6																
平年(H27-R6)	0.2	2.3	3.4	3.1	1.2	0.0	0.1	1.6	6.1	3.6	1.9	9.9	11.8	3.3	4.0	7.3	14.1	19.5	22.1	18.5	11.9	15.3	4.9	2.2