

# チャノコカクモンハマキの誘殺消長(ブドウ、園試砂丘地研究センター調査)

鳥取県病害虫防除所

令和8年8月上旬現在




図1 フェロモントラップにおけるチャノコカクモンハマキの誘殺消長

## 【チャノコカクモンハマキ (砂丘研露地)】

| 月          | 4    |      |      | 5    |      |     | 6   |      |      | 7    |      |      | 8    |      |      | 9    |      |      | 10   |      |      | 11   |     |     |
|------------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
|            | 上    | 中    | 下    | 上    | 中    | 下   | 上   | 中    | 下    | 上    | 中    | 下    | 上    | 中    | 下    | 上    | 中    | 下    | 上    | 中    | 下    | 上    | 中   | 下   |
| 本年         | 13   | 97   | 175  | 121  | 37   | 3   | 26  | 119  | 84   | 48   | 20   | 40   | 14   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 平年(H27-R6) | 11.1 | 42.5 | 67.6 | 67.0 | 40.2 | 8.5 | 4.1 | 45.3 | 61.5 | 41.7 | 16.5 | 39.7 | 44.0 | 24.6 | 17.0 | 31.8 | 73.2 | 80.2 | 73.4 | 44.1 | 29.7 | 21.4 | 6.1 | 3.7 |

## 【チャノコカクモンハマキ (砂丘研無加温)】

| 月          | 4   |     |     | 5   |     |     | 6   |     |     | 7   |     |      | 8    |     |     | 9   |      |      | 10   |      |      | 11   |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
|            | 上   | 中   | 下   | 上   | 中   | 下   | 上   | 中   | 下   | 上   | 中   | 下    | 上    | 中   | 下   | 上   | 中    | 下    | 上    | 中    | 下    | 上    | 中   | 下   |
| 本年         | 0   | 2   | 5   | 4   | 4   | 0   | 2   | 4   | 1   | 1   | 1   | 6    | 2    |     |     |     |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 平年(H27-R6) | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 8.9 | 5.7 | 2.3 | 11.4 | 12.5 | 4.3 | 4.6 | 7.8 | 16.8 | 18.5 | 21.6 | 16.8 | 11.5 | 15.1 | 4.9 | 2.2 |