斑点米カメムシ類すくい取り　集計結果

西部普及所・大山普及支所

○令和7年　斑点米カメムシ類（令和7年7月30日　本田調査）　25往復50回すくい取り虫数（町別平均値）

令和6年より多い

市町村名	調査筆数	斑点米カメムシ類の種類															備考
		イネカメムシ		アカスジ		クモヘリ		ホソハリ		トゲシラホシ		ホソミドリ		その他		合計	
		成	幼	成	幼	成	幼	成	幼	成	幼	成	幼	成	幼		
米子市	7	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	
日吉津村	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
南部町	13	3.5	2.7	6.9	0.0	1.8	0.1	0.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	4筆で多発生（飼料用稲）
伯耆町（旧溝口町）	2	0.0	3.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	
大山町（旧大山町）	18	0.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	
大山町（旧名和町）	5	0.2	0.0	4.2	0.0	1.2	0.0	0.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	8.4	
大山町（旧中山町）	7	0.0	0.0	62.0	3.6	1.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	1.6	0.0	74.0	3筆で多発生

○令和6年　斑点米カメムシ類（令和6年7月30日　本田調査）　25往復50回すくい取り虫数（町別平均値）

市町村名	調査筆数	斑点米カメムシ類の種類															備考
		イネカメムシ		アカスジ		クモヘリ		ホソハリ		トゲシラホシ		ホソミドリ		その他		合計	
		成	幼	成	幼	成	幼	成	幼	成	幼	成	幼	成	幼		
米子市	14	3.6	8.6	1.6	0.0	1.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	15.5	1筆で多発生
南部町	9	1.4	0.6	0.3	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.0	
伯耆町	4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	5.8	
大山町（旧大山町）	16	0.0	0.0	1.8	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9	
大山町（旧名和町）	6	0.0	0.2	1.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
大山町（旧中山町）	10	0.0	0.0	7.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	