

# 病虫害発生予察指導情報

## (果樹全般・果樹カメムシ類 No.11)

令和7年8月26日  
鳥取県病害虫防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 八頭町*** |        |       | 湯梨浜町**** |         | 北栄町 |        |        |
|-----|--------|--------|-------|----------|---------|-----|--------|--------|
|     | 本年     | 平年1*   | 平年2** | 本年       | 前年***** | 本年  | 平年1*   | 平年2**  |
| 4月計 | 0      | 1.4    | 0.8   | 0        | 19.0    | 0   | 2.9    | 2.4    |
| 5月計 | 16     | 163.5  | 20.1  | 56       | 811.0   | 13  | 261.5  | 111.2  |
| 6月計 | 42     | 677.6  | 178.5 | 47       | 3897.0  | 40  | 331.9  | 241.5  |
| 7・上 | 31     | 1150.7 | 165.3 | 42       | 4596.0  | 63  | 331.9  | 120.7  |
| ・中  | 13     | 631.0  | 67.7  | 17       | 1462.7  | 33  | 216.6  | 64.8   |
| ・下  | 13     | 1453.5 | 116.0 | 69       | 2564.3  | 36  | 352.8  | 79.7   |
| 8・上 | 47     | 266.2  | 145.2 | 277      | 4742.0  | 29  | 249.9  | 208.3  |
| ・中  | 145    | 412.9  | 302.7 | 313      | 1230.0  | 10  | 573.4  | 511.5  |
| ・下  |        | 543.5  | 453.8 |          | 896.0   |     | 1383.8 | 1511.5 |

\*平年1：北栄町：H27～R6 八頭町 R3～R6

\*\* 平年2（R6を除く）：北栄町：H27～R5 八頭町：R3～R5

\*\*\*八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\*\*湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

\*\*\*\*\*調査地点変更後3年未満のため、前年値を記載。

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 八頭町*** |        |       | 湯梨浜町**** |         | 北栄町 |       |       |
|-----|--------|--------|-------|----------|---------|-----|-------|-------|
|     | 本年     | 平年1*   | 平年2** | 本年       | 前年***** | 本年  | 平年1*  | 平年2** |
| 4月計 | 0      | 0.0    | 0.0   | 0        | 1.0     | 0   | 0.0   | 0.0   |
| 5月計 | 0      | 3.8    | 1.0   | 2        | 9.0     | 3   | 3.1   | 2.7   |
| 6月計 | 3      | 1911.9 | 260.8 | 24       | 5355.0  | 25  | 423.9 | 71.2  |
| 7・上 | 20     | 501.2  | 56.6  | 23       | 1410.0  | 23  | 93.0  | 15.7  |
| ・中  | 7      | 500.3  | 56.7  | 18       | 730.0   | 1   | 113.2 | 16.5  |
| ・下  | 23     | 910.4  | 147.6 | 119      | 3215.0  | 55  | 217.6 | 39.0  |
| 8・上 | 219    | 344.9  | 266.9 | 468      | 6096.6  | 35  | 143.4 | 95.2  |
| ・中  | 361    | 628.6  | 635.8 | 675      | 1683.4  | 108 | 123.3 | 101.4 |
| ・下  |        | 577.2  | 716.8 |          | 456.0   |     | 110.1 | 113.5 |

\*平年1：北栄町：H27～R6 八頭町 R3～R6

\*\* 平年2（R6を除く）：北栄町：H27～R5 八頭町：R3～R5

\*\*\*八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\*\*湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

\*\*\*\*\*調査地点変更後3年未満のため、前年値を記載。

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 八頭町** |        |       | 湯梨浜町*** |         | 北栄町 |       |       |
|-----|-------|--------|-------|---------|---------|-----|-------|-------|
|     | 本年    | 平年1*   | 平年2** | 本年      | 前年***** | 本年  | 平年1*  | 平年2** |
| 4月計 | 0     | 0.4    | 0.5   | 0       | 0       | 0   | 0.7   | 0.1   |
| 5月計 | 0     | 18.1   | 0.9   | 4       | 112.0   | 11  | 80.2  | 54.0  |
| 6月計 | 0     | 1612.2 | 45.3  | 12      | 11712.0 | 16  | 938.3 | 279.8 |
| 7・上 | 0     | 411.0  | 11.0  | 2       | 6840.0  | 1   | 373.6 | 118.0 |
| ・中  | 3     | 593.3  | 17.7  | 2       | 3055.0  | 1   | 289.3 | 59.9  |
| ・下  | 1     | 608.0  | 16.6  | 2       | 1817.0  | 9   | 275.4 | 102.0 |
| 8・上 | 0     | 84.8   | 44.9  | 24      | 1404.0  | 7   | 157.0 | 164.1 |
| ・中  | 2     | 77.2   | 91.2  | 76      | 136.0   | 2   | 123.7 | 133.7 |
| ・下  |       | 43.5   | 39.0  |         | 268.0   |     | 69.6  | 69.6  |

\*平年1：北栄町：H27～R6 八頭町 R3～R6

\*\* 平年2（R6を除く）：北栄町：H27～R5 八頭町：R3～R5

\*\*\*八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\*\*湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

\*\*\*\*\*調査地点変更後3年未満のため、前年値を記載。

表2 集合フェロモントラップ\*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 河原町**** |         | 北栄町 |       |        | 米子市***** |    | 南部町***** |    |
|-----|---------|---------|-----|-------|--------|----------|----|----------|----|
|     | 本年      | 前年***** | 本年  | 平年1** | 平年2*** | 本年       | 前年 | 本年       | 前年 |
| 4月計 | 6       | 9.0     | 26  | 13.7  | 13.2   | 1        | —  | 3        | —  |
| 5月計 | 115     | 531.0   | 72  | 109.0 | 82.5   | 4        | —  | 0        | —  |
| 6月計 | 182     | 6128.0  | 26  | 85.9  | 60.2   | 10       | —  | 1        | —  |
| 7・上 | 26      | 10149.0 | 9   | 88.4  | 39.0   | 2        | —  | 0        | —  |
| ・中  | 2       | 6385.4  | 2   | 77.5  | 21.3   | 0        | —  | 0        | —  |
| ・下  | 0       | 13371.0 | 0   | 118.0 | 19.0   | 0        | —  | 0        | —  |
| 8・上 | 0       | 3632.0  | 0   | 58.2  | 18.4   | 0        | —  | 0        | —  |
| ・中  | 0       | 1334.0  | 0   | 14.2  | 5.8    | 0        | —  | 0        | —  |
| ・下  |         | 644.0   |     | 9.4   | 4.4    |          | —  |          | —  |

\* 河原町（水盤式）は果樹園横、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所に設置。南部町（乾式）は金田に設置（西部普及所調査）。

\*\* 平年1：北栄町：H27～R6

\*\*\* 平年2（R6を除く）：北栄町：H27～R5

\*\*\*\* R5年度から郡家町花原の調査地点を河原町小倉に変更。

\*\*\*\*\* R7年度から米子市別所地区内で調査地点を変更。

R7年度から南部町会見地区の調査地点を南部町金田地区に変更。

\*\*\*\*\*調査地点変更後3年未満のため、前年値を記載。

## <1 情報の内容 8月中旬現在 >

- （1）チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて少なく、湯梨浜町で前年に比べて少ない。また、集合フェロモントラップにおける誘殺数は、河原町、北栄町で平年に比べて少ない。
- （2）クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年並、湯梨浜町で前年に比べて少ない。
- （3）ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて少なく、湯梨浜町で前年に比べて少ない。

### <参考>

#### ・発生量の記載

発生量の多少は中央値（median）の考え方を基に決定しており、発生の実態に即している。

そのため、本年値と平年値の関係が発生量の記載と一致しない場合がある。