

# 病虫害発生予察指導情報

## (果樹全般・果樹カメムシ類 No.10)

令和8年7月22日  
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町** |        | 湯梨浜町*** |        | 北栄町 |       |
|-----|-------|--------|---------|--------|-----|-------|
|     | 本年    | 平年*    | 本年      | 平年*    | 本年  | 平年*   |
| 4月計 | 1     | 1.1    | 19      | 9.5    | 5   | 2.9   |
| 5月計 | 359   | 134.0  | 422     | 301.3  | 658 | 262.6 |
| 6・上 | 240   | 38.0   | 66      | 16.4   | 70  | 46.1  |
| ・中  | 70    | 226.7  | 222     | 416.4  | 76  | 78.8  |
| ・下  | 213   | 285.8  | 312     | 936.8  | 98  | 209.5 |
| 7・上 | 181   | 926.8  | 269     | 1555.9 | 149 | 337.0 |
| ・中  | 55    | 507.3  | 274     | 497.0  | 75  | 217.7 |
| ・下  |       | 1165.5 |         | 891.7  |     | 353.5 |

\* 平年：八頭町 R3～R7、湯梨浜町 R5～R7、北栄町 H28～R7

\*\* 八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\* 湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町** |       | 湯梨浜町*** |        | 北栄町 |       |
|-----|-------|-------|---------|--------|-----|-------|
|     | 本年    | 平年*   | 本年      | 平年*    | 本年  | 平年*   |
| 4月計 | 0     | 0.0   | 5       | 0.5    | 0   | 0.0   |
| 5月計 | 2     | 3.0   | 51      | 4.7    | 10  | 3.3   |
| 6・上 | 2     | 1.7   | 12      | 0.0    | 1   | 0.5   |
| ・中  | 3     | 20.7  | 23      | 42.0   | 5   | 10.7  |
| ・下  | 11    | 87.2  | 39      | 95.4   | 2   | 23.0  |
| 7・上 | 24    | 404.9 | 53      | 484.9  | 22  | 94.8  |
| ・中  | 64    | 401.5 | 234     | 253.9  | 55  | 112.7 |
| ・下  |       | 733.0 |         | 1132.4 |     | 220.9 |

\* 平年：八頭町 R3～R7、湯梨浜町 R5～R7、北栄町 H28～R7

\*\* 八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\* 湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町** |       | 湯梨浜町*** |        | 北栄町 |       |
|-----|-------|-------|---------|--------|-----|-------|
|     | 本年    | 平年*   | 本年      | 平年*    | 本年  | 平年*   |
| 4月計 | 0     | 0.3   | 1       | 0.0    | 0   | 0.7   |
| 5月計 | 8     | 14.5  | 93      | 39.7   | 91  | 81.1  |
| 6・上 | 104   | 11.6  | 35      | 2.3    | 89  | 58.9  |
| ・中  | 43    | 197.1 | 131     | 672.5  | 107 | 506.0 |
| ・下  | 88    | 382.0 | 147     | 1487.5 | 80  | 598.6 |
| 7・上 | 43    | 328.8 | 184     | 2282.0 | 132 | 373.3 |
| ・中  | 37    | 475.2 | 192     | 1019.9 | 60  | 288.6 |
| ・下  |       | 486.6 |         | 607.3  |     | 275.5 |

\* 平年：八頭町 R3～R7、湯梨浜町 R5～R7、北栄町 H28～R7

\*\* 八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\* 湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表2 集合フェロモントラップ\*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 河原町*** |         | 北栄町 |       | 米子市**** |         | 南部町**** |         |
|-----|--------|---------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|
|     | 本年     | 平年**    | 本年  | 平年**  | 本年      | 前年***** | 前年      | 前年***** |
| 4月計 | 4      | 5.3     | 16  | 15.5  | 0       | 1.0     | 4       | 3.0     |
| 5月計 | 473    | 231.0   | 101 | 113.3 | 110     | 4.0     | 103     | 0.0     |
| 6・上 | 240    | 253.0   | 19  | 30.1  | 14      | 1.0     | 9       | 0.0     |
| ・中  | 253    | 1,259.6 | 24  | 17.1  | 51      | 6.3     | 18      | 1.0     |
| ・下  | 487    | 606.6   | 19  | 40.9  | 18      | 2.7     | 22      | 0.0     |
| 7・上 | 515    | 3,393.2 | 41  | 89.1  | 186     | 2.0     | 82      | 0.0     |
| ・中  | 88     | 2,129.4 | 60  | 77.3  | 146     | 0.0     | 27      | 0.0     |
| ・下  |        | 4,457.1 |     | 118.0 |         | 0.0     |         | 0.0     |

\* 河原町（水盤式）は果樹園横、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所に設置。南部町（乾式）は金田に設置（西部普及所調査）。

\*\* 平年：河原町 R5～R7、北栄町 H28～R7

\*\*\* R5年度から郡家町花原の調査地点を河原町小倉に変更。

\*\*\*\* R7年度から米子市別所地区内で調査地点を変更。

R7年度から南部町会見地区の調査地点を南部町金田地区に変更。

\*\*\*\*\*調査地点変更後3年未満のため、前年値を記載。

## < 1 情報の内容 7月中旬現在 >

- (1) チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、湯梨浜町で平年並、北栄町で平年に比べてやや多い。また、集合フェロモントラップにおける誘殺数は、河原町で平年並、北栄町で平年に比べてやや多く、米子市、南部町で前年に比べて多い。
- (2) クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、湯梨浜町で平年並、北栄町で平年に比べてやや多い。
- (3) ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、湯梨浜町で平年並、北栄町で平年に比べてやや多い。

## < 参考 >

### ・発生量の記載

発生量の多少は中央値（median）の考え方を基に決定しており、発生の実態に即している。

そのため、本年値と平年値の関係が発生量の記載と一致しない場合がある。