

# 病虫害発生予察指導情報

## (果樹全般・果樹カメムシ類 No.14)

令和8年9月3日  
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町** |        | 湯梨浜町*** |        | 北栄町 |        |
|-----|-------|--------|---------|--------|-----|--------|
|     | 本年    | 平年*    | 本年      | 平年*    | 本年  | 平年*    |
| 4月計 | 1     | 1.1    | 19      | 9.5    | 5   | 2.9    |
| 5月計 | 359   | 134.0  | 422     | 301.3  | 658 | 262.6  |
| 6月計 | 523   | 550.5  | 600     | 1369.5 | 244 | 334.4  |
| 7月計 | 382   | 2599.6 | 1704    | 2944.6 | 374 | 908.1  |
| 8・上 | 234   | 221.1  | 1187    | 1764.3 | 436 | 247.7  |
| ・中  | 726   | 364.1  | 1864    | 778.0  | 466 | 568.7  |
| ・下  | 1520  | 495.2  | 1815    | 862.3  | 81  | 1401.0 |
| 9・上 |       | 363.0  |         | 835.3  |     | 282.2  |
| ・中  |       | 290.2  |         | 602.8  |     | 247.7  |
| ・下  |       | 109.3  |         | 184.3  |     | 108.1  |

\* 平年：八頭町 R3～R7、湯梨浜町 R5～R7、北栄町 H28～R7

\*\* 八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\* 湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町** |        | 湯梨浜町*** |        | 北栄町 |       |
|-----|-------|--------|---------|--------|-----|-------|
|     | 本年    | 平年*    | 本年      | 平年*    | 本年  | 平年*   |
| 4月計 | 0     | 0.0    | 5       | 0.5    | 0   | 0.0   |
| 5月計 | 2     | 3.0    | 51      | 4.7    | 10  | 3.3   |
| 6月計 | 16    | 109.7  | 74      | 137.4  | 8   | 34.2  |
| 7月計 | 369   | 1539.5 | 778     | 1871.2 | 138 | 428.5 |
| 8・上 | 204   | 314.9  | 477     | 2265.9 | 123 | 141.6 |
| ・中  | 489   | 579.7  | 383     | 1086.7 | 68  | 124.6 |
| ・下  | 237   | 508.9  | 271     | 796.9  | 13  | 112.8 |
| 9・上 |       | 119.3  |         | 322.4  |     | 28.4  |
| ・中  |       | 60.0   |         | 339.1  |     | 14.9  |
| ・下  |       | 19.9   |         | 112.8  |     | 2.5   |

\* 平年：八頭町 R3～R7、湯梨浜町 R5～R7、北栄町 H28～R7

\*\* 八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\* 湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町** |        | 湯梨浜町*** |        | 北栄町 |        |
|-----|-------|--------|---------|--------|-----|--------|
|     | 本年    | 平年*    | 本年      | 平年*    | 本年  | 平年*    |
| 4月計 | 0     | 0.3    | 1       | 0.0    | 0   | 0.7    |
| 5月計 | 8     | 14.5   | 93      | 39.7   | 91  | 81.1   |
| 6月計 | 235   | 590.6  | 313     | 2162.2 | 276 | 1163.5 |
| 7月計 | 188   | 1290.6 | 499     | 3909.2 | 206 | 937.5  |
| 8・上 | 394   | 67.8   | 605     | 481.7  | 116 | 156.0  |
| ・中  | 504   | 62.2   | 1142    | 108.3  | 138 | 120.3  |
| ・下  | 218   | 37.0   | 316     | 132.1  | 27  | 70.0   |
| 9・上 |       | 36.4   |         | 117.3  |     | 59.4   |
| ・中  |       | 32.0   |         | 87.0   |     | 46.2   |
| ・下  |       | 40.3   |         | 28.2   |     | 31.0   |

\* 平年：八頭町 R3～R7、湯梨浜町 R5～R7、北栄町 H28～R7

\*\* 八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\* 湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表2 集合フェロモントラップ\*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 河原町*** |         | 北栄町 |       | 米子市**** |         | 南部町**** |         |
|-----|--------|---------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|
|     | 本年     | 平年**    | 本年  | 平年**  | 本年      | 前年***** | 前年      | 前年***** |
| 4月計 | 4      | 5.3     | 16  | 15.5  | 0       | 1       | 4       | 3       |
| 5月計 | 473    | 231.0   | 101 | 113.3 | 110     | 4       | 103     | 0       |
| 6月計 | 980    | 2,119.2 | 62  | 88.1  | 83      | 10      | 49      | 1       |
| 7月計 | 677    | 9,979.6 | 145 | 284.4 | 393     | 2       | 140     | 0       |
| 8・上 | 37     | 1,210.7 | 25  | 58.2  | 45      | 0       | 51      | 0       |
| ・中  | 376    | 444.7   | 15  | 14.2  | 69      | 0       | 22      | 0       |
| ・下  | 534    | 214.9   | 19  | 9.4   | 44      | 0       | 49      | 0       |
| 9・上 |        | 162.7   |     | 6.3   |         | 0       |         | 3       |
| ・中  |        | 61.1    |     | 5.7   |         | 0       |         | 2.7     |
| ・下  |        | 16.7    |     | 4.7   |         | 13      |         | 0.3     |

\* 河原町（水盤式）は果樹園横、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所に設置。南部町（乾式）は金田に設置（西部普及所調査）。

\*\* 平年：河原町 R5～R7、北栄町 H28～R7

\*\*\* R5年度から郡家町花原の調査地点を河原町小倉に変更。

\*\*\*\* R7年度から米子市別所地区内で調査地点を変更。

R7年度から南部町会見地区の調査地点を南部町金田地区に変更。

\*\*\*\*\*調査地点変更後3年未満のため、前年値を記載。

## < 1 情報の内容 8月下旬現在 >

- (1) チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、北栄町で平年に比べてやや少なく、八頭町、湯梨浜町で平年に比べて多い。また、集合フェロモントラップにおける誘殺数は、河原町、北栄町で平年に比べてやや多い。米子市、南部町で前年に比べて多い。
- (2) クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、湯梨浜で平年に比べて少なく、北栄町で平年に比べてやや少なく、八頭町で平年並。
- (3) ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、北栄町で平年に比べてやや少なく、八頭町、湯梨浜町で平年に比べて多い。

## < 参考 >

### ・発生量の記載

発生量の多少は中央値（median）の考え方を基に決定しており、発生の実態に即している。

そのため、本年値と平年値の関係が発生量の記載と一致しない場合がある。