

令和 8 年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：ナシ黒斑病

令和 8 年 9 月 2 5 日

鳥取県病害虫防除所

表 ナシ黒斑病の新梢葉における発病率（令和 8 年）

地区	新梢葉の発病率 ¹⁾ (%)								
	6 月			7 月			9 月		
	本年	前年	平年 ²⁾	本年	前年	平年 ²⁾	本年	前年	平年 ²⁾
河原町	1.0	1.1	1.0 ⁵⁾	0.5	1.5	1.3 ⁵⁾	0.5	2.1	5.0 ⁵⁾
佐治町	1.1	0	0.2 ³⁾	0.5	2.4	1.9 ³⁾	4.8	4.9	3.4 ³⁾
青谷町	0	1.0	1.4 ⁴⁾	1.4	0.5	2.4 ⁴⁾	1.0	0	3.8 ⁴⁾
八頭町	0	1.2	0.8	3.8	0.5	1.7	4.5	2.6	3.8
湯梨浜町1 (別所)	0.5	0	2.2	0	0.9	2.0	1.4	0	2.9
湯梨浜町2 (勝負谷)	0	0.9	1.5	0.5	0.4	1.7	2.5	0	7.8
倉吉市	0	0.5	1.0	0.5	1.2	2.1	0	4.0	5.3
北栄町 (園試)	0.5	2.0	3.3	0.6	10.7	10.9	3.0	32.0	19.9
琴浦町	0	2.7	2.5	4.1	0.4	3.8	3.9	1.4	4.3
南部町	0.5	0	0.2 ⁴⁾	0.5	0	0.4 ⁴⁾	0.5	0.5	1.5 ⁴⁾
平均	0.4	0.9	1.4	1.2	1.9	2.8	2.2	4.8	5.8

¹⁾ 1 園あたり 1 0 新梢について全葉及び病葉数を調査した。

²⁾ 平成 2 8 ～令和 7 年のうち、3 年以上の平均値。

³⁾ 令和 3 年より調査園を変更した。

⁴⁾ 令和元年より調査園を変更した。

⁵⁾ 令和 4 年 6 月より調査園を変更した。

<要約>

9 月 1 8、2 4 日に実施した巡回調査の結果、平均発病葉率は 2. 2 %（平年：5. 8 %）と平年に比べてやや低かった。

<対策>

今後、収穫後の防除を行っていない園では収穫後防除を実施する。防除薬剤はアントラコール顆粒水和剤の 5 0 0 倍液等がある。