

出穂した時期別の収穫適期予測について（令和8年9月28日現在）

収穫適期の予測を行いますので、適期収穫を目指した収穫作業計画の参考として活用してください。

【情報を活用する上での注意点】

○高温年での収穫適期は、出穂後の日平均気温積算値を基に予測しており、ひとめぼれ 910～1110℃、コシヒカリ 890～1140℃となる月日です（R5年度水稻・大豆・小豆栽培指導指針）。星空舞は、標高300m未満の地域で1000～1260℃（有効積算気温620～770℃）、標高300m以上の地域で920～1170℃（有効積算気温510～620℃）となる月日です（R5年版「星空舞」栽培手帳）。

○アメダスの実測値及び1ヶ月予報値を基に各1kmメッシュの日平均気温を推定し、積算気温により収穫時期を予測しています。

○収穫適期予測に必要な気象データは、農研機構と㈱ライフビジネスウェザーが共同開発し、㈱ライフビジネスウェザーが提供するメッシュ農業気象システムの気象データを用いています。

○あくまでも目安であり、地形、かんがい水温などのほ場条件、水管理、施肥などの栽培条件等によっては誤差がでることがあります。

○収穫適期を予測したいほ場の標高は、地図などで検索してください。

【現時点での状況】

特に早生品種の刈り遅れに注意し、玄米品質の低下を防ぎましょう。

ひとめぼれ予測収穫適期

（月/日）

標高	出穂期（ほ場の約50%が出穂した日）				
	7/20	7/25	7/30	8/5	8/10
0～49m	予測日を過ぎたため 掲載を終了します。				
50～99m					
100～149m					
150～199m					
200～249m					
250～299m					
300～349m	-	-	-	-	-
350～399m	-	-	-	-	-

コシヒカリ予測収穫適期

（月/日）

標高	出穂期（ほ場の約50%が出穂した日）				
	7/25	7/30	8/5	8/10	8/15
0～49m	-	-	-	9/12 ～ 9/23	9/17 ～ 9/29
50～99m	-	-	-	9/13 ～ 9/24	9/18 ～ 9/30
100～149m	-	-	-	9/13 ～ 9/25	9/19 ～ 10/1
150～199m	-	-	-	9/14 ～ 9/26	9/20 ～ 10/2
200～249m	-	-	-	9/15 ～ 9/27	9/20 ～ 10/3
250～299m	-	-	-	9/15 ～ 9/27	9/21 ～ 10/4
300～349m	-	-	-	9/16 ～ 9/28	9/21 ～ 10/5
350～399m	-	-	-	9/16 ～ 9/29	9/22 ～ 10/6

星空舞予測収穫適期

(月/日)

標高	出穂期（ほ場の約50%が出穂した日）				
	7/30	8/5	8/10	8/15	8/20
0～49m	-	-	9/17 ～ 9/29	9/22 ～ 10/5	9/29 ～ 10/13
50～99m	-	-	9/18 ～ 9/30	9/23 ～ 10/7	9/30 ～ 10/15
100～149m	-	-	9/18 ～ 10/1	9/24 ～ 10/8	10/1 ～ 10/16
150～199m	-	-	9/19 ～ 10/2	9/25 ～ 10/9	10/2 ～ 10/18
200～249m	-	-	9/20 ～ 10/3	9/26 ～ 10/10	10/3 ～ 10/19
250～299m	-	-	9/20 ～ 10/4	9/26 ～ 10/12	10/4 ～ 10/21
300～349m	-	-	9/17 ～ 9/30	9/23 ～ 10/7	9/30 ～ 10/15
350～399m	-	-	9/18 ～ 10/1	9/23 ～ 10/8	9/30 ～ 10/17

きぬむすめ予測収穫適期

(月/日)

標高	出穂期（ほ場の約50%が出穂した日）			
	8/10	8/15	8/20	8/25
0～49m	-	9/17 ～ 9/27	9/24 ～ 10/4	10/1 ～ 10/12
50～99m	-	9/18 ～ 9/28	9/25 ～ 10/6	10/2 ～ 10/13
100～149m	-	9/19 ～ 9/29	9/25 ～ 10/7	10/3 ～ 10/15
150～199m	-	9/20 ～ 9/30	9/26 ～ 10/8	10/3 ～ 10/16

【参考】鳥取県内における1kmメッシュの平均標高分布図

