病害虫発生予察指導情報
（果樹全般・果樹カメムシ類No.20）

令和８年１１月６日
鳥取県病害虫防除所

表１－１　予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町**		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
４月計	1	1.1	19	9.5	5	2.9
５月計	359	134.0	422	301.3	658	262.6
６月計	523	550.5	600	1369.5	244	334.4
７月計	382	2599.6	1704	2944.6	374	908.1
８月計	2480	1080.4	4866	3404.7	983	2217.5
９・上	484	363.0	445	835.3	26	282.2
・中	1098	290.2	931	602.8	62	247.7
・下	1243	109.3	139	184.3	33	108.1
10・上	13	33.5	58	71.1	26	36.7
・中	192	21.3	37	40.1	14	4.2
・下	80	3.6	2	4.7	2	0.4

＊　平年：八頭町 R3～R7 、湯梨浜町 R5～R7 、北栄町 H28～R7
＊＊　八頭町はR3年度から調査地点を変更。
＊＊＊ 湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表１－２　予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町**		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
４月計	0	0.0	5	0.5	0	0.0
５月計	2	3.0	51	4.7	10	3.3
６月計	16	109.7	74	137.4	8	34.2
７月計	369	1539.5	778	1871.2	138	428.5
８月計	930	1403.5	1131	4149.6	204	379.0
９・上	30	119.3	70	322.4	1	28.4
・中	32	60.0	160	339.1	3	14.9
・下	22	19.9	19	112.8	0	2.5
10・上	0	7.6	13	38.5	4	2.3
・中	68	4.5	114	48.3	22	1.7
・下	88	1.6	111	2.9	13	1.8

＊　平年：八頭町 R3～R7 、湯梨浜町 R5～R7 、北栄町 H28～R7
＊＊　八頭町はR3年度から調査地点を変更。
＊＊＊ 湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表１－３　予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町**		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
４月計	0	0.3	1	0.0	0	0.7
５月計	8	14.5	93	39.7	91	81.1
６月計	235	590.6	313	2162.2	276	1163.5
７月計	188	1290.6	499	3909.2	206	937.5
８月計	1116	167.0	2063	722.1	281	346.4
９・上	49	36.4	95	117.3	13	59.4
・中	117	32.0	97	87.0	13	46.2
・下	270	40.3	58	28.2	8	31.0
10・上	17	40.4	33	43.4	14	36.9
・中	116	15.6	39	19.5	15	19.7
・下	112	7.7	16	8.9	6	16.2

＊　平年：八頭町 R3～R7 、湯梨浜町 R5～R7 、北栄町 H28～R7
＊＊　八頭町はR3年度から調査地点を変更。
＊＊＊ 湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表２　集合フェロモントラップ*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	河原町***		北栄町		米子市****		南部町****	
	本年	平年**	本年	平年**	本年	前年*****	前年	前年*****
４月計	4	5.3	16	15.5	0	1	4	3
５月計	473	231.0	101	113.3	110	4	103	0
６月計	980	2,119.2	62	88.1	83	10	49	1
７月計	677	9,979.6	145	284.4	393	2	140	0
８月計	947	1,870.3	59	81.8	158	0	122	0
９・上	145	162.7	5	6.3	10	0	14	3
・中	72	61.1	0	5.7	3	0	9	2.7
・下	83	16.7	7	4.7	5	13	12	0.3
10・上	5	24.0	1	4.5	15	4.2	15	2.1
・中	42	20.3	0	2.7	2	1.8	2	0.9
・下	6	4.0	2	1.5	0	1	2	0

＊ 河原町（水盤式）は果樹園横、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所に設置。南部町（乾式）は金田に設置（西部普及所調査）。
** 平年：河原町 R5～R7、北栄町 H28～R7
*** R5年度から郡家町花原の調査地点を河原町小倉に変更。
**** R7年度から米子市別所地区内で調査地点を変更。
　　R7年度から南部町会見地区の調査地点を南部町金田地区に変更。
*****調査地点変更後３年未満のため、前年値を記載。

＜１　情報の内容　10月下旬現在　＞

（１）　チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、湯梨浜町で平年並、北栄町で平年に比べてやや多く、八頭町で平年に比べて多い。また、集合フェロモントラップにおける誘殺数は、河原町、北栄町で平年に比べてやや多い。米子市、南部町で前年に比べて多い。

（２）　クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、湯梨浜町、北栄町で平年に比べて多い。

（３）　ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、北栄町で平年並、八頭町、湯梨浜町で平年に比べて多い。

〈参考〉
・発生量の記載
発生量の多少は中央値（median）の考え方を基に決定しており、発生の実態に即している。
そのため、本年値と平年値の関係が発生量の記載と一致しない場合がある。