

事務連絡
平成26年9月11日

担当者 殿

農産安全管理課農薬対策室
課長補佐(農薬指導班担当)

短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の変更について
(有効成分；アセフェート)

農薬の急性的影響の評価の結果に基づき必要となった使用方法の変更に係る、都道府県の防除指針等への反映、農薬使用者への情報の周知等については、「短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の周知等について」(平成26年9月10日付け農産安全課長、植物防疫課長通知)でお知らせしているところです。

下記のアセフェートを有効成分とする農薬について、別紙のとおり使用制限となる登録の変更申請がされており、農薬の製造者から農薬販売者、使用者等に対して、変更後の使用方法を記載したチラシ等を用いて情報が提供され、変更後の使用方法に基づいて農薬を使用するよう注意喚起が行われております。

つきましては、貴職管下の都道府県に対し、変更の登録がされる前であっても、農薬製造者からの宣伝や製品に付された票せん等により提供されている変更後の使用方法に基づき農薬を使用するよう農薬使用者を指導するとともに、申請されている変更後の使用方法に基づき、都道府県の防除指針等への反映や生産者団体等が作成する防除暦の変更の指導等に努めるよう、周知指導いただくようお願いいたします。

記

有効成分：アセフェート

農薬名：ホクコーオルトラン水和剤(農薬登録第13175号、北興化学工業(株))

ホクコーオルトラン粒剤(農薬登録13177号、北興化学工業(株))

家庭園芸用ホクコーオルトラン水和剤(農薬登録第19566号、北興化学工業(株))

家庭園芸用ホクコーオルトラン粒剤(農薬登録19568号、北興化学工業(株))

オルトラン水和剤(農薬登録第19992号、アリスタライフサイエンス(株))

オルトラン粒剤(農薬登録第19993号、アリスタライフサイエンス(株))

ジェイエース粒剤(農薬登録第20939号、全国農業協同組合連合会)

「興農」ジェネレート粒剤(農薬登録第20940号、興農股イ分有限公司)

ジェイエース水溶剤(農薬登録第20967号、全国農業協同組合連合会)

「興農」ジェネレート水溶剤（農薬登録第20968号、興農股イ分有限公司）
家庭園芸用オルトラン水和剤（農薬登録第21519号、アリスタ ライフサイエンス（株））
家庭園芸用オルトラン粒剤（農薬登録第21520号、アリスタ ライフサイエンス（株））
オルトランD X粒剤（農薬登録第21733号、住友化学園芸（株））
家庭園芸用G F オルトラン粒剤（農薬登録第21789号、住友化学園芸（株））
家庭園芸用G F オルトラン水和剤（農薬登録第21819号、住友化学園芸（株））
スミフェート水溶剤（農薬登録第21903号、住友化学（株））
スミフェート粒剤（農薬登録第21904号、住友化学（株））

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年11月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第13175号	ホクコーオトルン水和剤	アセフェート水和剤	北興化学工業株式会社
第19992号	オトルン水和剤	アセフェート水和剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第19566号	家庭園芸用ホクコーオトルン水和剤	アセフェート水和剤	北興化学工業株式会社
第21519号	家庭園芸用オトルン水和剤	アセフェート水和剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第21819号	家庭園芸用GFオトルン水和剤	アセフェート水和剤	住友化学園芸株式会社
第13177号	ホクコーオトルン粒剤	アセフェート粒剤	北興化学工業株式会社
第19993号	オトルン粒剤	アセフェート粒剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第19568号	家庭園芸用ホクコーオトルン粒剤	アセフェート粒剤	北興化学工業株式会社
第21520号	家庭園芸用オトルン粒剤	アセフェート粒剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第21789号	家庭園芸用GFオトルン粒剤	アセフェート粒剤	住友化学園芸株式会社
第21733号	オトルンDX粒剤	アセフェート・クロチアジソン粒剤	住友化学園芸株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

1) アセフェート水和剤

（第13175号 ホクコーオトルン水和剤、第19992号 オトルン水和剤）

- ①作物名「なす」を削除する。
- ②作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」、「3回以内」から「1回」及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ③作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000～1500倍又は1000～2000倍」を「1500倍又は1500倍」に変更する。

～2000倍」、「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」、「3回以内」から「1回」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

- ④作物名「レタス」の「使用時期」を「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に変更する。
- ⑤作物名「ブロッコリー」を削除する。
- ⑥作物名「だいこん」を削除する。
- ⑦作物名「はつかだいこん」を削除する。
- ⑧作物名「非結球あぶらな科葉菜類（ケール、からしな、みずな、ルッコラを除く）」を「非結球あぶらな科葉菜類（ケール、からしな、みずな、ルッコラ、たかなを除く）」に変更する。
- ⑨作物名「かぶ」を削除する。
- ⑩作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」、「4回以内」から「2回以内」及び「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ⑪作物名「トマト」及び「ミニトマト」を削除する。
- ⑫作物名「とうもろこし」を「未成熟とうもろこし」に変更する。
- ⑬作物名「ぶどう」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫30日前まで」から「収穫60日前まで」、「2回以内」から「1回」及び「2回以内」から「1回」に変更する。
- ⑭作物名「かき」の「適用病害虫名」の「カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、カキノヘタムシガ」の「希釈倍数」を「1000～1500倍」から「1500倍」に変更し、「適用病害虫名」の「フジコナカイガラムシ」の「希釈倍数」を「1000倍」から「1500倍」に変更し、「適用病害虫名」の「カキノヒメヨコバイ」を削除する。
- ⑮作物名「かんきつ」を削除する。
- ⑯作物名「茶」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「摘採30日前まで」から「摘採45日前まで」、「2回以内」から「1回」及び「2回以内」から「1回」に変更する。
- ⑰作物名「オクラ」の「使用時期」を「収穫7日前まで」から「収穫開始7日前まで」に変更する。

2) アセフェート水和剤（家庭園芸用）

（第19566号 家庭園芸用ホクコーオトルン水和剤、第21519号 家庭園芸用オトルン水和剤、第21819号 家庭園芸用GFオトルン水和剤）

- ①作物名「なす」を削除する。
- ②作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」、「3回以内」から「1回」及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ③作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000～1500倍又は1000～2000倍」を「1500倍又は1500～2000倍」、「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」、「3回以内」から「1回」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

- ④作物名「レタス」の「使用時期」を「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更する。
- ⑤作物名「ブロッコリー」を削除する。
- ⑥作物名「だいこん」を削除する。
- ⑦作物名「はつかだいこん」を削除する。
- ⑧作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」、「4 回以内」から「2 回以内」及び「5 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内）」から「3 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内）」に変更する。
- ⑨作物名「トマト」及び「ミニトマト」を削除する。
- ⑩作物名「とうもろこし」を「未成熟とうもろこし」に変更する。
- ⑪作物名「ぶどう」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 30 日前まで」から「収穫 60 日前まで」、「2 回以内」から「1 回」及び「2 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑫作物名「かき」の「適用病害虫名」の「カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、カキノヘタムシガ」の「希釈倍数」を「1000~1500 倍」から「1500 倍」に変更し、「適用病害虫名」の「カキノヒメヨコバイ」を削除する。
- ⑬作物名「かんきつ」を削除する。
- ⑭作物名「オクラ」の「使用時期」を「収穫 7 日前まで」から「収穫開始 7 日前まで」に変更する。

3) アセフェート粒剤

(第 13177 号 ホクコーオウルラン粒剤、第 19993 号 オウルラン粒剤)

- ①作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫 21 日前まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時植穴散布及び生育期葉面散布」から「植穴処理」及び「3 回以内」から「2 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内）」に変更する。
- ②作物名「トマト」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ③作物名「ミニトマト」を削除する。
- ④作物名「きゅうり、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑤作物名「ピーマン」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「株元散布」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑥作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫 21 日前まで」から「定植時」、「3 回以内」

から「1回」、「植穴散布及び生育期株元散布」から「植穴処理」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

⑦作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫14日前まで」から「定植時」、「3回以内」から「1回」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

⑧作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。

⑨作物名「はつかだいこん」を削除する。

⑩作物名「かぶ」の「使用時期」を「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に変更する。

⑪作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。

4) アセフェート粒剤（家庭園芸用）

（第19568号 家庭園芸用ホクコーオトルラン粒剤、第21520号 家庭園芸用オトルラン粒剤、第21789号 家庭園芸用GFオトルラン粒剤）

①作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫21日前までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時植穴散布及び生育期葉面散布」から「植穴処理」及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。

②作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫21日前までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「植穴散布及び生育期株元散布」から「植穴処理」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

③作物名「トマト」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布」から「植溝散布又は植穴処理」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

④作物名「ミニトマト」を削除する。

⑤作物名「きゅうり、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布」から「植溝散布又は植穴処理」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

⑥作物名「ピーマン」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日までの生育期」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布」から「株元散布」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

⑦作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫14日前までの生育期」から「定植時」、「3回以内」

から「1回」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

⑧作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前植溝散布」から「植溝散布」及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。

⑨作物名「はつかだいこん」を削除する。

⑩作物名「かぶ」の「使用時期」を「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に変更する。

⑪作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。

5) アセフェート・クロチアニジン粒剤（第21733号 オルランDX粒剤）

作物名「トマト、なす、きゅうり」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「3回以内」から「1回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

1) アセフェート水和剤

（第 13175 号 ホクコーオ尔特ラン水和剤、第 19992 号 オ尔特ラン水和剤）

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
なす	アブラムシ類、アザミウマ類	1000～2000 倍	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000 倍					
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマキリンウバ	1000～1500 倍	収穫 14 日前まで	2 回以内			2 回以内 (は種前及びは種時の処理は合計 1 回以内)
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1000～2000 倍					2 回以内 (は種前の処理は 1 回以内)
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～1500 倍	収穫 21 日前まで	1 回			1 回
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1000～2000 倍					
レタス	ヨトウムシ	1000～1500 倍	10a 当り 25L 散布	4 回以内			5 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、 植付後は 4 回以内)
ブロッコリー	オオタバコガ	1000 倍					
だいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダコソシンクイムシ	1500 倍	収穫前日まで	3 回以内			3 回以内
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1500～2000 倍					
はつかだいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダコソシンクイムシ	1500 倍	1 回	1 回	2 回以内 (定植時の処理は 1 回以内、 定植後は 1 回以内)		
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1500～2000 倍					
非結球 あぶらな科葉菜類 (ケール、からしな、 みずな、ルッコラを 除く)	アブラムシ類	1500 倍	10a 当り 25L 散布	4 回以内	5 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、 植付後は 4 回以内)		
かぶ	アブラムシ類、アオムシ、コガ	1000 倍					
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ	1000 倍	収穫 7 日前まで	4 回以内	10a 当り 25L 散布		
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨトウムシ	1000 倍					
	アブラムシ類	300 倍					
トマト	アブラムシ類	1000～2000 倍	収穫前日まで	3 回以内	3 回以内		
	マメハモグリバエ	1000 倍					
ミニトマト	アブラムシ類	1500 倍	収穫 14 日前まで	1 回	2 回以内 (定植時の処理は 1 回以内、 定植後は 1 回以内)		
とうもろこし		1000 倍	収穫 7 日前まで	2 回以内	2 回以内		
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500～2000 倍	収穫 30 日前まで				
		ハマキムシ類	1500 倍				
かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハタムシガ	1000～1500 倍	収穫 45 日前まで	2 回以内	2 回以内		
	カキノヒメヨコバイ フジコナカイガラムシ	1000 倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフェートを含む農薬の総使用回数
かんきつ	コクモンハマキ、シャクトリムシ類 ヤノカバラムシ第1世代 ツノロウムシ、ルビローロウムシ ミカンキイロアザミウマ ネキアザミウマ ゴホウノミドリヒメコバエ	1000倍	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類、ケシキスイ類 コアオハナムグリ、アザミウマ類	1000～1500倍				
	ミカントゲコナジラミ	1500～2000倍				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバエ	1000～2000倍	摘採30日前まで	2回以内		2回以内
	チャノコクモンハマキ	1000～1500倍				

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフェートを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマネギンウバ	1000～1500倍	100～300 L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)		
	アオムシ、コナガ アブラムシ類	1000～2000倍							
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500倍							
	アオムシ、コナガ アブラムシ類	1500～2000倍							
レタス	ヨトウムシ オオタバコガ	1000～1500倍 1000倍							
	非結球あぶらな 科葉菜類(ケール、 からしな、みずな、 ルッコラ、たかなを除く)	アブラムシ類			1500倍		収穫21日前まで	1回	1回
オクラ		アブラムシ類 ミドリコバエ			1000倍		収穫開始7日前まで	2回以内	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨトウムシ	300倍			25L/10a		収穫30日前まで		
	アブラムシ類 ジヤカイモガ	1000～1500倍			100～300 L/10a		収穫7日前まで		
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類	1000倍					収穫7日前まで	1回	2回以内
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメコバエ ハマキムシ類	1500～2000倍	200～700 L/10a	収穫60日前まで	1回	1回			
	カキタアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキハタムシガ フジコナカバラムシ	1500倍		収穫45日前まで	2回以内	2回以内			
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバエ	1000～2000倍	200～400 L/10a	摘採45日前まで	1回	1回			
	チャノコクモンハマキ	1000～1500倍							

2) アセフェート水和剤(家庭園芸用)

(第19566号 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤、第21519号 家庭園芸用オ
 ルトラン水和剤、第21819号 家庭園芸用GFオ尔特ラン水和剤)

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数	
なす	アブラムシ類、アザミウマ類	1000～2000倍	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内	
	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000倍					
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマキシンウバ	1000～1500倍	収穫14日 前まで	2回以内			2回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計1回以内)
	アオムシ、コカガ、アブラムシ類	1000～2000倍					2回以内 (は種前の処理は 1回以内)
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～1500倍	収穫7日 前まで	4回以内			5回以内 (植付時の処理は 1回以内、植付後は 4回以内)
	アオムシ、コカガ、アブラムシ類	1000～2000倍					3回以内
レタス	ヨトウムシ	1000～1500倍	収穫前日 まで	3回以内			2回以内 (定植時の処理は 1回以内、定植後は 1回以内)
ブロッコリー	オオタバコガ	1000倍					1回
だいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダレコシクイムシ	1500倍	収穫7日 前まで	2回以内			2回以内
	アオムシ、コカガ、アブラムシ類	1500～2000倍					1回
はつかだいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダレコシクイムシ	1500倍	収穫7日 前まで	4回以内	2回以内		
	アオムシ、コカガ、アブラムシ類	1500～2000倍			1回		
ばれいしょ	ヨトウムシ テントウムシダマシ幼虫	1000倍	収穫7日 前まで	4回以内	5回以内 (植付時の処理は 1回以内、植付後は 4回以内)		
	アブラムシ類、シヤガバネガ	1000～1500倍			3回以内		
トマト	アブラムシ類	1000～2000倍	収穫前日 まで	3回以内	3回以内		
	マメハモグリバエ	1000倍					
ミニトマト	アブラムシ類	1500倍	収穫14日 前まで	1回	2回以内 (定植時の処理は 1回以内、定植後は 1回以内)		
オクラ	アブラムシ類、トリヨコバイ	1000倍	収穫7日 前まで	2回以内	1回		
とうもろこし	アブラムシ類						
ぶどう	チャノキアザミウマ フタテヒメヨコバイ	1500～2000倍	収穫30日 前まで	2回以内	2回以内		
	ハマキムシ類*	1500倍					
かき	カキタアザミウマ チャノキアザミウマ カキノハムシガ	1000～1500倍	収穫45日 前まで	3回以内	3回以内		
	カキノヒメヨコバイ						
かんきつ	コカモンハマキ、シヤクトリムシ類 ヤノハハラムシ第1世代 ツノロウムシ、ルビローウムシ ミカンキアザミウマ ネギアザミウマ ゴボウノミドリヒメヨコバイ	1000倍	収穫30日 前まで	3回以内	3回以内		
	アブラムシ類、ケシキスイ類 コアハナムグリ、アザミウマ類	1000～1500倍					
	ミカンゲコサジラミ	1500～2000倍					

*: 但し、登録番号21519号 家庭園芸用オ尔特ラン水和剤には「ぶどう」の適用病害虫「ハマキムシ類」の登録はありません。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマキシンウバ	1000～1500 倍	100～300 mL/m ²	収穫 30 日 前まで	1 回	散布	2 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内)		
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1000～2000 倍					1 回		
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500 倍			3 回以内		3 回以内	3 回以内	
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1500～2000 倍						3 回以内	
レタス	ヨトウムシ オオタバコガ	1000～1500 倍					2 回以内	3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)	
ばれいしよ	テントウムシダマシ幼虫 ヨトウムシ	1000 倍			2 回以内			1 回	
	アブラムシ類、ジャガイモガ	1000～1500 倍					2 回以内		
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ	1000 倍			200～700 mL/m ²		収穫開始 7 日前まで	1 回	1 回
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類						収穫 7 日 前まで	2 回以内	2 回以内
ぶどう	チャノキアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500～2000 倍			200～700 mL/m ²		収穫 60 日 前まで	1 回	1 回
	ハマキムシ類*	1500 倍	2 回以内	2 回以内					
かき	カキクダアザミウマ チャノキアザミウマ カキノハタムシガ	1500 倍	200～700 mL/m ²	収穫 45 日 前まで	2 回以内	2 回以内			

*: 但し、登録番号 21519 号家庭園芸用ホトリン水和剤には「ぶどう」の適用病害虫「ハマキムシ類」の登録はありません。

3) アセフェート粒剤

(第 13177 号 ホクコーオ尔特ラン粒剤、第 19993 号 オ尔特ラン粒剤)

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コガ ヨウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時及び 収穫 21 日前まで	3 回以内	定植時植穴散布 及び生育期葉面 散布	3 回以内
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期	1 回	散布	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時及び 収穫前日まで	3 回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	2 回以内 (定植時の 処理は 1 回 以内、定植 後は 1 回以 内)
ミニトマト			定植時	1 回	定植時作条散布 又は植穴散布	
きゅうり なす			アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ	2g/株	定植時及び 収穫前日まで	
ピーマン	アブラムシ類					
はくさい	アオムシ、コガ ヨウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時及び 収穫 21 日前まで	3 回以内	植穴散布及び 生育期株元散布	3 回以内
ブロッコリー	ヨウムシ	6kg/10a (2g/株)	定植時及び収穫 14 日前まで		株元散布	
だいこん	アオムシ、コガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前	1 回	は種前 作条散布	2 回以内 (は種前及 びは種時の 処理は合計 1 回以内)
はつかだいこん						2 回以内 (は種前の 処理は 1 回 以内)
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 14 日前まで	1 回	株元散布	1 回
ばれいしょ		3～6kg/10a (1～2g/株)	植付時			作条散布

[変更後]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフトを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コガ ヨウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期		散布	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時		作条散布 又は植穴処理	1回
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ					
ピーマン	アブラムシ類	2g/株			株元散布	
はくさい	アオムシ、コガ ヨウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)			植穴処理	
ブロッコリー	ヨウムシ	6kg/10a (2g/株)			株元散布	
だいこん	アオムシ、コガ アブラムシ類	3～4kg/10a			は種前	
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 21 日 前まで		株元散布	
ばれいしょ		3～6kg/10a (1～2g/株)	植付時		作条散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)

4) アセフェート粒剤 (家庭園芸用)

(第 19568 号 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剤、第 21520 号 家庭園芸用オ尔特ラン粒剤、第 21789 号 家庭園芸用 G F オ尔特ラン粒剤)

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コガネヨトウムシ アブラムシ類	3~6g/m ² (1株当り1~2g)	定植時及び収穫21日前までの生育期	3回以内	定植時植穴散布及び生育期葉面散布	3回以内
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期	1回	散布	
はくさい	アオムシ、コガネヨトウムシ アブラムシ類	3~6g/m ² (1株当り1~2g)	定植時及び収穫21日前までの生育期	3回以内	植穴散布及び生育期株元散布	3回以内
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ		定植時及び収穫前日までの生育期		定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布	
ミニトマト			定植時	1回	定植時植溝又は植穴散布	2回以内 (定植時の処理は1回以内、定植後は1回以内)
きゅうり なす	アブラムシ類 アサシマ類 オンシツコナジラミ		定植時及び収穫前日までの生育期	3回以内	定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布	3回以内
ピーマン	アブラムシ類	1株当り2g				
ブロッコリー	ヨトウムシ	6g/m ² (1株当り2g)	定植時及び収穫14日前までの生育期	1回	株元散布	2回以内 (は種前及びは種時の処理は合計1回以内)
だいこん	アオムシ、コガネアブラムシ類	3~4g/m ²	は種前		は種前植溝散布	2回以内 (は種前の処理は1回以内)
はつかだいこん			は種前	は種前植溝散布	1回	
かぶ	アブラムシ類	4g/m ²	収穫14日前まで	1回	株元散布	1回
ばれいしょ		3~6g/m ² (1株当り1~2g)	植付時**		植溝散布	5回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内)

** : 但し、登録番号 21789 号 家庭園芸用 G F オ尔特ラン粒剤の「ばれいしょ」の使用時期は「植付前」です。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コガネヨトウムシ アブラムシ類	3～6g/m ² (1株当たり1～2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期		散布	
はくさい	アオムシ、コガネヨトウムシ アブラムシ類	3～6g/m ² (1株当たり1～2g)	定植時		植穴処理	1回
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ				植溝散布又は植穴処理	
きゅうり なす	アブラムシ類 アサシロキ類 オンシツコナジラミ				株元散布	
ピーマン	アブラムシ類	1株当たり2g			植溝散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ	6g/m ² (1株当たり2g)			株元散布	
だいこん	アオムシ、コガネアブラムシ類	3～4g/m ²			は種前	
かぶ	アブラムシ類	4g/m ²	収穫21日前まで		株元散布	
ばれいしょ		3～6g/m ² (1株当たり1～2g)	植付時		植溝散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)

5) アセフェート・クロチアニジン粒剤 (第 21733 号 オルトラン DX 粒剤)

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
トマト	アブラムシ類	1g/株	定植時	1 回	植穴処理 土壌混和	3 回以内	4 回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 3 回以内)
なす		2g/株					
きゅうり	コナジラミ類						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
トマト	アブラムシ類	1g/株	定植時	1 回	植穴処理 土壌混和	1 回	4 回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 3 回以内)
なす		2g/株					
きゅうり	コナジラミ類						

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年11月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20939号	ジェイエース粒剤	アセフェート粒剤	全国農業協同組合連合会
第21904号	スミフェート粒剤	アセフェート粒剤	住友化学株式会社
第20967号	ジェイエース水溶剤	アセフェート水溶剤	全国農業協同組合連合会
第21903号	スミフェート水溶剤	アセフェート水溶剤	住友化学株式会社

■変更内容及び変更理由

1) アセフェート粒剤（第20939号 ジェイエース粒剤、第21904号 スミフェート粒剤）

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- ① 作物名「キャベツ」の「適用病害虫名」、「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「ハイマダラノメイガ」を削除し、「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期葉面散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ② 作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ③ 作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫14日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「株元散布」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ④ 作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」に、及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。
- ⑤ 作物名「かぶ」の「使用時期」及び「使用方法」をそれぞれ「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に、及び「生育期葉面散布」から「株元散布」に変更する。
- ⑥ 作物名「なばな」の「使用方法」を「定植時土壌混和处理」から「土壌混和处理」に変更する。
- ⑦ 作物名「きゅうり、トマト、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫前日まで」

から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。

- ⑧ 作物名「ミニトマト」を削除する。
- ⑨ 作物名「みずな」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に、及び「2回以内（定植時は1回以内）」から「1回」に変更する。
- ⑩ 作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ⑪ 作物名「こまつな」の「使用方法」を「は種前作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に変更する。
- ⑫ 作物名「チンゲンサイ」の「使用方法」を「定植時作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に変更する。

2) アセフェート水溶剤

(第 20967 号 ジェイエース水溶剤、第 21903 号 スミフェート水溶剤)

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- ① 作物名「かんきつ」を削除する。
- ② 作物名「かき」の「希釈倍数」を「1000～1500倍」から「1500倍」に変更する。
- ③ 作物名「ぶどう」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫30日前まで」から「収穫60日前まで」に、「2回以内」から「1回」に、及び「2回以内」から「1回」に変更する。
- ④ 作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」に、「3回以内」から「1回」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ⑤ 作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000～1500倍」から「1500倍」に、「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に、「3回以内」から「1回」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ⑥ 作物名「レタス」の「使用時期」を「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に変更する。
- ⑦ 作物名「ブロッコリー」を削除する。
- ⑧ 作物名「だいこん」を削除する。
- ⑨ 作物名「かぶ」を削除する。
- ⑩ 作物名「チンゲンサイ」の「希釈倍数」を「1000倍」から「1500倍」に変更する。
- ⑪ 作物名「みずな」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000倍」から「1500倍」に、「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に、「2回以内」から「1回」及び「2回以内（定植時は1回以内）」から「1回」に変更する。
- ⑫ 作物名「トマト」、「ミニトマト」及び「なす」を削除する。

- ⑬ 作物名「オクラ」の「使用時期」を「収穫3日前まで」から「収穫開始7日前まで」に変更する。
- ⑭ 作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」に、「4回以内」から「2回以内」に、及び「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ⑮ 作物名「茶」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「摘採30日前まで」から「摘採45日前まで」に、「2回以内」から「1回」に、及び「2回以内」から「1回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

1) アセフェート粒剤（第 20939 号 ジェイエース粒剤、第 21904 号 スミフェート粒剤）

[変更前]

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数	
キャベツ	アオムシ コガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当り 1～2g)	定植時及び生育期 但し、 収穫 21 日前まで	3 回 以内	定植時植穴処理 及び 生育期葉面散布	3 回以内	
	ハイマダラノメイガ		収穫 21 日前まで		生育期葉面散布		
はくさい	アオムシ コガ ヨトウムシ アブラムシ類		定植時及び生育期 但し、 収穫 21 日前まで				定植時植穴処理 及び 生育期株元散布
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (1株当り 2g)	定植時及び生育期 但し、 収穫 14 日前まで				
だいこん	アオムシ コガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前	1 回	は種前作条散布	2 回以内 (は種前及び は種時の 処理は 合計 1 回以内)	
かぶ		4kg/10a	収穫 14 日前まで			生育期葉面散布	
なばな	アブラムシ類	6kg/10a (1株当り 2g)	定植時		定植時土壌混和 処理	1 回	
きゅうり	オンシツコナジラミ アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当り 1～2g)	定植時及び生育期 但し、収穫前日まで	3 回 以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内	
トマト							
ミニトマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ			定植時	1 回	定植時作条散布 又は 植穴散布	2 回以内 (定植時の処理 は 1 回以内、 定植後は 1 回以内)
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ アザミウマ類		定植時及び生育期 但し、収穫前日まで	3 回 以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内	
みずな		6kg/10a	定植時		定植時作条散布 後土壌混和	2回以内 (定植時は 1回以内)	
ばれいしょ	アブラムシ類	3～6kg/10a	植付時	1回	作条散布	5回以内 (植付時の処理 は1回以内、 植付後は 4回以内)	
こまつな			は種前			は種前作条 散布後土壌混和	1回
チンゲンサイ			定植時			定植時作条 散布後土壌混和	

[変更後]

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	アセフェートを含 む農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ コガネ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当り 1～2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 1回以内)
はくさい						
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (1株当り 2g)			株元散布	
だいこん	アオムシ コガネ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前		作条散布	
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 21 日 前まで		株元散布	
なばな		6kg/10a (1株当り 2g)			土壌混和処理	1回
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 アザミウマ類	3～6kg/10a (1株当り 1～2g)	定植時		作条散布 又は 植穴処理	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ					
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ アザミウマ類					
みずな		6kg/10a			作条散布後 土壌混和	
ばれいしょ	アブラムシ類	3～6kg/10a	植付時	作条散布	3回以内 (植付時の処理は 1回以内、 植付後は 2回以内)	
こまつな			は種前	作条散布後 土壌混和	1回	
チンゲンサイ			定植時			

2) アセフェート水溶剤

(第 20967 号 ジェイエース水溶剤、第 21903 号 スミフェート水溶剤)

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ヤノ初イガラシ ツノロウムシ ルビノロウムシ ミカンキイロアザミウマ アザミウマ類	1000 倍	200~700 L/10a	収穫 30 日前 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
	コアオハナムケリ チャノキイロアザミウマ アブラムシ類 ケシキスイ類	1000~ 1500 倍					
	ミカントケコジラミ	1500 倍					
かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハナムシガ	1000~ 1500 倍	200~700 L/10a	収穫 45 日前 まで	2 回 以内		2 回以内
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500~ 2000 倍		収穫 30 日前 まで			
キャベツ	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 タマキニンウハ	1000~ 1500 倍	100~300 L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内		3 回以内
	はくさい			ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類			
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内		2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)
ブロッコリー	ヨトウムシ						
だいこん	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1500~ 2000 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)	
	ハイマダラノメガ	1500 倍					
かぶ	アオムシ コナガ アブラムシ類	1500~ 2000 倍	100~300 L/10a	収穫 21 日前 まで	1 回	1 回	
チンゲンサイ	アブラムシ類	1000 倍		収穫 14 日前 まで	2 回 以内	2 回以内 (定植時は 1 回以内)	
みずな			1000~ 2000 倍	収穫前日 まで	3 回 以内	3 回以内	
トマト	ママハモグリハエ オオタバコガ	1000 倍					

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフトを含む農薬の総使用回数		
ミニトマト	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	1回	散布	2回以内 (定植時の処理は1回以内、定植後は1回以内)		
	マメハモグサ、リハエ、オオタバコガ	1000倍							
なす	アブラムシ類	1000～2000倍		1000倍	収穫7日前まで		3回以内	3回以内	
	ミカンキイロアザミウマ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アザミウマ類								
オクラ	アブラムシ類、フタテノミ、リヒメヨコバイ				収穫3日前まで		1回		1回
ばれいしょ	ヨトウムシ、オオニジュウヤホシテントウ				収穫7日前まで		4回以内		5回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内)
	アブラムシ類	1000～2000倍							
		300倍	25L/10a						
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ	1000～2000倍	200～400 L/10a	摘採30日前まで	2回以内	2回以内			
	チャノコカモンハマキ	1000～1500倍							

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフトを含む農薬の総使用回数
かき	カキタ ^{アサミウマ} チャノキイ ^{アサミウマ} カキノハ ^{ムシガ}	1500倍	200～700 L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
ぶどう	チャノキイ ^{アサミウマ} フタ ^{テンヒメヨコバ}	1500～ 2000倍		収穫60日前まで	1回		1回
キャベツ	ハスモン ^{ヨトウ} アオ ^{ムシ} コナ ^ガ ヨトウ ^{ムシ} アブ ^{ラムシ} 類 タナ ^キ ソウ ^{ワバ}	1000～ 1500倍	100～300 L/10a	収穫30日前まで			1回
はくさい	ハスモン ^{ヨトウ} アオ ^{ムシ} コナ ^ガ ヨトウ ^{ムシ} アブ ^{ラムシ} 類	1500倍			1回		
レタス	ヨトウ ^{ムシ} ハスモン ^{ヨトウ} オタ ^ハ コ ^ガ	1000～ 1500倍 1000倍			3回以内		3回以内
チンゲンサイ みずな	アブ ^{ラムシ} 類	1500倍	1000倍	収穫21日前まで	1回		1回
オクラ	アブ ^{ラムシ} 類 フタ ^{テンミト} リ ^{ヒメヨ} コ ^バ イ	1000～ 2000倍 300倍		収穫開始7日前まで			
ばれいしょ	ヨトウ ^{ムシ} オオ ^{ニシ} ユ ^{ウヤ} ホ ^シ テ ^{ント} ウ		1000～ 2000倍 300倍	25L/10a	収穫30日前まで	2回以内	3回以内 (植付時の処理は 1回以内、植付後は 2回以内)
	アブ ^{ラムシ} 類						
茶	チャノキイ ^{アサミウマ} チャノミ ^{トリ} ヒ ^{メヨ} コ ^バ イ	1000～ 2000倍	200～400 L/10a	摘採45日前まで	1回	1回	
	チャノコ ^{カク} モン ^{ハマ} キ	1000～ 1500倍					

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年11月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20940号	「興農」ジェネレート粒剤	アセフェート粒剤	興農股份有限公司
第20968号	「興農」ジェネレート水溶剤	アセフェート水溶剤	興農股份有限公司

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

1) アセフェート粒剤（第20940号 「興農」ジェネレート粒剤）

- ① 作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期（収穫21日前まで）」から「定植時に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期葉面散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ② 作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ③ 作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」に、及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。
- ④ 作物名「きゅうり、トマト、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期（収穫前日まで）」から「定植時に、「3回以内」から「1回」に、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ⑤ 作物名「ミニトマト」を削除する。
- ⑥ 作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。

2) アセフェート水溶剤 (第 20968 号 「興農」 ジェネレート水溶剤)

- ① 作物名「かんきつ」を削除する。
- ② 作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「3 回以内」から「1 回」に、及び「3 回以内」から「2 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内)」に変更する。
- ③ 作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000~1500 倍」を「1500 倍」に、「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「3 回以内」から「1 回」に、及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ④ 作物名「ブロッコリー」を削除する。
- ⑤ 作物名「だいこん」を削除する。
- ⑥ 作物名「トマト」、「ミニトマト」及び「なす」を削除する。
- ⑦ 作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「4 回以内」から「2 回以内」に、及び「5 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内)」から「3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)」に変更する。
- ⑧ 作物名「茶」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「摘採 30 日前まで」から「摘採 45 日前まで」に、「2 回以内」から「1 回」に、及び「2 回以内」から「1 回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

1) アセフェート粒剤（第20940号 「興農」 ジェネレート粒剤）

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ コガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時及び生育期 (収穫21日前まで)	3回以内	定植時植穴処理 及び 生育期葉面散布	3回以内
はくさい	アオムシ アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり2g)			定植時植穴処理 及び 生育期株元散布	
だいこん	アオムシ コガ アブラムシ類		3～4kg/10a	は種前	1回	は種前作条散布
きゅうり	オンシツコナジラミ アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時及び生育期 (収穫前日まで)	3回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3回以内
トマト	オンシツコナジラミ アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり2g)				
ミニトマト	オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時	1回	定植時作条散布 又は 植穴散布	2回以内 (定植時の処理 は1回以内、 定植後は 1回以内)
なす	アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり2g)	定植時及び生育期 (収穫前日まで)	3回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3回以内
ばれいしょ		3～6kg/10a	植付時	1回	作条散布	5回以内 (植付時の処理 は1回以内、植付 後は4回以内)

[変更後]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 1回以内)
はくさい	アオムシ アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり 2g)				
	コナガ ヨトウムシ					
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前		作条散布	
きゅうり	オンシツコナジラミ アサミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時		作条散布 又は 植穴処理	1回
トマト	オンシツコナジラミ	6kg/10a (1株当たり 2g)				
	アブラムシ類					
なす	アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり 2g)				
ばれいしょ		3～6kg/10a	植付時	作条散布	3回以内 (植付時の処理は 1回以内、植付後は 2回以内)	

2) アセフェート水溶剤 (第 20968 号 「興農」 ジェネレート水溶剤)

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	ヤノ初カラムシ ツノロムシ ルビノロムシ コアホナムグリ ミカンキイロアザミウマ	1000 倍	収穫 30 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
	チャノキイロアザミウマ アブラムシ類	1000~1500 倍					
キャベツ	アオムシ コナガ	1500 倍	収穫 7 日前 まで	2 回以内			2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)
はくさい			収穫 14 日前 まで				
だいこん	ヨウムシ アブラムシ類	1000 倍	収穫 前日 まで	1 回			2 回以内 (定植時の処理 は 1 回以内、定 植後は 1 回以内)
ブロッコリー	ヨウムシ						
トマト	アブラムシ類	1000~2000 倍	収穫 前日 まで	3 回以内			3 回以内
	マハモグリバエ	1000 倍					
ミニトマト	アブラムシ類	1000~2000 倍	収穫 前日 まで	1 回			2 回以内 (定植時の処理 は 1 回以内、定 植後は 1 回以内)
	マハモグリバエ	1000 倍					
なす	アブラムシ類	1000~2000 倍	収穫 7 日前 まで	3 回以内	3 回以内		
	ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍					
ばれいしょ	アブラムシ類 オオニジュウヤホシテントウ	1000 倍	収穫 7 日前 まで	4 回以内	5 回以内 (植付時の処理 は 1 回以内、植 付後は 4 回以内)		
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000~2000 倍	摘採 30 日前 まで	2 回以内	2 回以内		
	チャノコカクモンハマキ	1000~1500 倍					

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	アゼートを含 む農薬の 総使用回数
キャベツ	アムシ コガ ヨウムシ アブラムシ類	1000～ 1500 倍	100～300 L/10a	収穫 30 日前 まで	1 回	散布	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 1 回以内)
はくさい		1500 倍					1 回
ばれいしょ	アブラムシ類 オオシブユウホシテントウ	1000 倍	2 回 以内	3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)			
茶	チャノキイロアサミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノコクモンハマキ	1000～ 2000 倍 1000 ～ 1500 倍	200～400 L/10a	摘採 45 日前 まで	1 回		1 回