

Ⅲ 集計表
第4部 特殊集計

1 年齢調整集計

重み付け平均を計算するためのワークシート(*)を利用して、主要な指標に関する年齢調整値を算出した。

(*)国立保健医療科学院ホームページ <http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/download/eiyocalc/tools.xls>

なお、基準人口は、2005年国勢調査全国人口男女計（千人）である。

【参考】健康増進施策推進・評価のための健康・栄養調査データ活用マニュアル（2011年11月30日版），35ページIV 1（3）年齢調整

(1) 食塩摂取量

鳥取県（H24国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)）

年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差
男性				
20～29	23	10.2	4.2	0.87
30～39	35	9.9	3.2	0.54
40～49	43	10.3	4.0	0.60
50～59	47	11.2	3.8	0.55
60～69	61	11.0	4.2	0.53
70以上	77	11.0	3.9	0.44
(再)20歳以上	286	10.7	3.9	0.23
年齢調整値	-	10.6	-	0.24
女性				
20～29	26	7.9	2.3	0.46
30～39	34	8.5	2.7	0.47
40～49	44	8.3	2.8	0.42
50～59	49	9.2	3.1	0.45
60～69	69	10.1	3.4	0.40
70以上	110	9.4	3.5	0.33
(再)20歳以上	332	9.2	3.2	0.18
年齢調整値	-	8.9	-	0.17
男女計				
(再)20歳以上	618	9.9	3.6	0.15
性年齢調整値	-	9.8	-	0.15

全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差
男性				
20～29	1,078	11.0	4.3	0.13
30～39	1,715	10.7	4.2	0.10
40～49	1,835	11.1	4.3	0.10
50～59	1,859	11.8	4.7	0.11
60～69	2,763	11.8	4.4	0.08
70以上	3,015	11.1	4.5	0.08
(再)20歳以上	12,265	11.3	4.4	0.04
年齢調整値	-	11.3	-	0.04
女性				
20～29	1,177	8.8	3.5	0.10
30～39	1,935	9.0	3.4	0.08
40～49	2,113	9.1	3.6	0.08
50～59	2,251	10.1	3.7	0.08
60～69	3,088	10.2	4.0	0.07
70以上	3,897	9.8	3.9	0.06
(再)20歳以上	14,461	9.6	3.8	0.03
年齢調整値	-	9.5	-	0.03
男女計				
(再)20歳以上	26,726	10.4	4.2	0.03
性年齢調整値	-	10.4	-	0.03

(2) 野菜摂取量

鳥取県（H24国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)）

年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差
男性				
20～29	23	221.6	169.6	35.37
30～39	35	244.4	173.9	29.40
40～49	43	254.9	134.7	20.54
50～59	47	291.1	144.0	21.00
60～69	61	353.6	275.5	35.28
70以上	77	325.0	213.2	24.29
(再)20歳以上	286	296.8	204.7	12.11
年齢調整値	-	282.3	-	11.39
女性				
20～29	26	226.0	125.6	24.64
30～39	34	236.7	152.1	26.08
40～49	44	248.0	111.9	16.88
50～59	49	278.5	161.6	23.09
60～69	69	328.8	173.3	20.87
70以上	110	298.9	189.7	18.09
(再)20歳以上	332	283.3	167.6	9.20
年齢調整値	-	269.8	-	9.02
男女計				
(再)20歳以上	618	289.5	185.7	7.47
性年齢調整値	-	276.0	-	7.26

全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差
男性				
20～29	1,078	254.4	161.5	4.92
30～39	1,715	265.6	172.2	4.16
40～49	1,835	272.4	169.8	3.96
50～59	1,859	290.5	168.1	3.90
60～69	2,763	321.8	195.2	3.71
70以上	3,015	323.2	195.6	3.56
(再)20歳以上	12,265	295.1	183.2	1.65
年齢調整値	-	288.4	-	1.65
女性				
20～29	1,177	234.7	138.6	4.04
30～39	1,935	250.6	155.3	3.53
40～49	2,113	253.4	147.9	3.22
50～59	2,251	288.8	160.0	3.37
60～69	3,088	312.6	171.2	3.08
70以上	3,897	295.0	170.5	2.73
(再)20歳以上	14,461	279.3	163.0	1.36
年齢調整値	-	273.1	-	1.37
男女計				
(再)20歳以上	26,726	286.5	172.8	1.06
性年齢調整値	-	280.8	-	1.07

(3) 果物摂取量（ジュース、ジャムを含む）

鳥取県（H24国民健康・栄養調査（鳥取県実施分集計結果））

年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差
男性				
20～29	23	19.0	56.5	11.78
30～39	35	25.2	86.6	14.64
40～49	43	59.0	92.7	14.13
50～59	47	91.7	111.6	16.27
60～69	61	118.0	122.3	15.66
70以上	77	146.3	155.9	17.77
(再)20歳以上	286	93.1	127.0	7.51
年齢調整値	-	77.5	-	6.29
女性				
20～29	26	82.3	120.3	23.59
30～39	34	70.5	89.0	15.26
40～49	44	87.0	108.4	16.34
50～59	49	145.1	135.3	19.33
60～69	69	146.5	142.8	17.19
70以上	110	162.0	151.9	14.49
(再)20歳以上	332	130.7	138.1	7.58
年齢調整値	-	116.5	-	7.27
男女計				
全年齢	618	113.3	134.3	5.40
性年齢調整値	-	97.0	-	4.81

全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差
男性				
20～29	1,078	61.9	145.1	4.42
30～39	1,715	46.4	98.3	2.37
40～49	1,835	56.2	98.5	2.30
50～59	1,859	74.1	111.4	2.58
60～69	2,763	126.5	152.1	2.89
70以上	3,015	156.9	160.3	2.92
(再)20歳以上	12,265	96.7	140.2	1.27
年齢調整値	-	87.3	-	1.20
女性				
20～29	1,177	72.5	108.1	3.15
30～39	1,935	73.3	104.5	2.38
40～49	2,113	78.9	106.5	2.32
50～59	2,251	119.8	128.6	2.71
60～69	3,088	158.9	149.0	2.68
70以上	3,897	161.8	146.1	2.34
(再)20歳以上	14,461	120.9	135.5	1.13
年齢調整値	-	111.5	-	1.06
男女計				
(再)20歳以上	26,726	109.8	138.2	0.85
性年齢調整値	-	99.4	-	0.80

(4) 朝食欠食率

鳥取県（H24国民健康・栄養調査（鳥取県実施分集計結果））

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	23	34.8	9.93
30～39	35	22.9	7.10
40～49	43	14.0	5.28
50～59	47	17.0	5.48
60～69	61	8.2	3.51
70以上	77	1.3	1.29
(再)20歳以上	286	12.6	1.96
年齢調整値	-	16.1	2.43
女性			
20～29	26	15.4	7.08
30～39	34	17.6	6.54
40～49	44	13.6	5.17
50～59	49	6.1	3.42
60～69	69	8.7	3.39
70以上	110	2.7	1.55
(再)20歳以上	332	8.4	1.53
年齢調整値	-	10.5	1.97
男女計			
(再)20歳以上	618	10.4	1.23
性年齢調整値	-	13.3	1.57

全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	1,078	29.5	1.39
30～39	1,715	25.8	1.06
40～49	1,835	19.6	0.93
50～59	1,859	13.1	0.78
60～69	2,763	7.9	0.51
70以上	3,015	3.9	0.35
(再)20歳以上			#DIV/0!
年齢調整値	-	16.4	0.36
女性			
20～29	1,177	22.1	1.21
30～39	1,935	14.8	0.81
40～49	2,113	12.1	0.71
50～59	2,251	9.2	0.61
60～69	3,088	6.5	0.44
70以上	3,897	3.6	0.30
(再)20歳以上			#DIV/0!
年齢調整値	-	11.2	0.29
男女計			
(再)20歳以上			#DIV/0!
性年齢調整値	-	13.8	0.23

(5) 歩数

鳥取県（H24国民健康・栄養調査（鳥取県実施分集計結果））

年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差
男性				
20～29	19	7,216	4,142	950.34
30～39	30	8,093	5,099	931.01
40～49	38	6,669	3,066	497.36
50～59	39	5,739	2,741	438.88
60～69	52	6,561	3,541	491.07
70以上	63	5,222	3,414	430.14
(再)20歳以上	241	6,337	3,688	237.58
年齢調整値	-	6,563	-	269.22
女性				
20～29	25	6,833	3,987	797.43
30～39	29	7,328	4,130	766.93
40～49	43	7,045	3,235	493.40
50～59	44	6,403	2,893	436.20
60～69	66	6,838	3,600	443.09
70以上	86	3,813	2,792	301.08
(再)20歳以上	293	5,963	3,581	209.18
年齢調整値	-	6,342	-	230.67
男女計				
(再)20歳以上	534	6,132	3,631	157.12
性年齢調整値	-	6,452	-	177.26

全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差
男性				
20～29	953	8,059	4,907	158.95
30～39	1,587	8,004	4,493	112.78
40～49	1,676	7,753	4,252	103.86
50～59	1,718	7,698	4,323	104.30
60～69	2,588	7,303	4,299	84.51
70以上	2,629	5,223	3,782	73.76
(再)20歳以上	11,151	7,139	4,400	41.67
年齢調整値	-	7,317	-	44.19
女性				
20～29	1,050	6,948	4,281	132.11
30～39	1,824	6,653	3,448	80.73
40～49	1,991	7,003	3,686	82.61
50～59	2,153	7,086	3,545	76.40
60～69	2,948	6,644	3,722	68.55
70以上	3,252	4,285	3,169	55.57
(再)20歳以上	13,218	6,257	3,741	32.54
年齢調整値	-	6,411	-	34.32
男女計				
(再)20歳以上	24,369	6,661	4,080	26.14
性年齢調整値	-	6,864	-	27.98

(6) 運動習慣がある者の割合

鳥取県（H24国民健康・栄養調査（鳥取県実施分集計結果））

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	10	30.0	14.49
30～39	12	16.7	10.76
40～49	24	29.2	9.28
50～59	14	35.7	12.81
60～69	34	23.5	7.27
70以上	49	38.8	6.96
(再)20歳以上	143	30.8	3.86
年齢調整値	-	29.1	4.35
女性			
20～29	11	0.0	0.00
30～39	19	21.1	9.35
40～49	25	28.0	8.98
50～59	32	12.5	5.85
60～69	50	36.0	6.79
70以上	77	33.8	5.39
(再)20歳以上	214	27.6	3.05
年齢調整値	-	21.9	2.81
男女計			
(再)20歳以上	357	28.9	2.40
性年齢調整値	-	25.5	2.59

全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	411	27.4	2.20
30～39	824	20.8	1.42
40～49	875	21.2	1.38
50～59	998	27.6	1.42
60～69	1,785	43.2	1.17
70以上	2,042	49.2	1.11
(再)20歳以上	6,935	36.1	0.58
年齢調整値	-	31.6	0.60
女性			
20～29	554	14.0	1.47
30～39	1,219	13.9	0.99
40～49	1,341	18.0	1.05
50～59	1,550	24.5	1.09
60～69	2,347	40.1	1.01
70以上	2,649	36.9	0.94
(再)20歳以上	9,660	28.2	0.46
年齢調整値	-	24.6	0.45
男女計			
(再)20歳以上	16,595	31.5	0.36
性年齢調整値	-	28.1	0.37

(7) 飲酒習慣がある者の割合

鳥取県（H24国民健康・栄養調査（鳥取県実施分集計結果））

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	31	12.9	6.02
30～39	38	31.6	7.54
40～49	46	34.8	7.02
50～59	49	44.9	7.11
60～69	63	44.4	6.26
70以上	82	26.8	4.89
(再)20歳以上	309	33.7	2.69
年齢調整値	-	32.9	2.69
女性			
20～29	29	3.4	3.39
30～39	43	14.0	5.28
40～49	46	17.4	5.59
50～59	53	13.2	4.65
60～69	70	1.4	1.42
70以上	120	2.5	1.43
(再)20歳以上	361	7.2	1.36
年齢調整値	-	8.8	1.66
男女計			
(再)20歳以上	670	19.4	1.53
性年齢調整値	-	20.8	1.58

全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	1,304	14.2	0.97
30～39	2,060	30.8	1.02
40～49	2,108	37.3	1.05
50～59	2,167	45.3	1.07
60～69	2,997	44.2	0.91
70以上	3,322	25.0	0.75
(再)20歳以上	13,958	34.0	0.40
年齢調整値	-	33.0	0.40
女性			
20～29	1,382	3.3	0.48
30～39	2,225	10.0	0.64
40～49	2,359	13.0	0.69
50～59	2,497	10.4	0.61
60～69	3,349	6.6	0.43
70以上	4,333	2.0	0.21
(再)20歳以上	16,145	7.3	0.20
年齢調整値	-	7.6	0.22
男女計			
(再)20歳以上	30,103	19.7	0.23
性年齢調整値	-	20.3	0.23

(8) 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合

鳥取県（H24国民健康・栄養調査（鳥取県実施分集計結果））

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	31	6.5	4.41
30～39	38	13.2	5.48
40～49	46	19.6	5.85
50～59	49	18.4	5.53
60～69	63	15.9	4.60
70以上	82	7.3	2.88
(再)20歳以上	309	13.3	1.93
年齢調整値	-	13.5	2.01
女性			
20～29	29	3.4	3.39
30～39	43	14.0	5.28
40～49	46	17.4	5.59
50～59	53	13.2	4.65
60～69	70	1.4	1.42
70以上	120	2.5	1.43
(再)20歳以上	361	7.2	1.36
年齢調整値	-	8.8	1.66
男女計			
(再)20歳以上	670	10.0	1.16
性年齢調整値	-	11.1	1.30

全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	1,304	8.2	0.76
30～39	2,060	15.6	0.80
40～49	2,108	19.0	0.85
50～59	2,167	22.6	0.90
60～69	2,997	17.0	0.69
70以上	3,322	6.4	0.43
(再)20歳以上	13,958	14.7	0.30
年齢調整値	-	14.9	0.31
女性			
20～29	1,382	5.2	0.60
30～39	2,225	10.6	0.65
40～49	2,359	13.4	0.70
50～59	2,497	10.6	0.62
60～69	3,349	6.7	0.43
70以上	4,333	2.0	0.21
(再)20歳以上	16,145	7.6	0.21
年齢調整値	-	8.1	0.23
男女計			
(再)20歳以上	30,103	10.9	0.18
性年齢調整値	-	11.5	0.19

(9) 現在習慣的に喫煙している者の割合

鳥取県（H24国民健康・栄養調査（鳥取県実施分集計結果））

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	31	48.4	8.98
30～39	38	44.7	8.07
40～49	46	37.0	7.12
50～59	48	41.7	7.12
60～69	62	25.8	5.56
70以上	81	18.5	4.32
(再)20歳以上	306	32.7	2.68
年齢調整値	-	36.0	2.86
女性			
20～29	29	13.8	6.40
30～39	43	14.0	5.28
40～49	45	6.7	3.72
50～59	54	1.9	1.83
60～69	71	4.2	2.39
70以上	116	0.9	0.86
(再)20歳以上	358	5.0	1.15
年齢調整値	-	6.8	1.56
男女計			
(再)20歳以上	664	17.8	1.48
性年齢調整値	-	21.4	1.63

全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	1,300	37.6	1.34
30～39	2,057	43.2	1.09
40～49	2,107	43.2	1.08
50～59	2,162	41.0	1.06
60～69	2,978	31.9	0.85
70以上	3,292	16.9	0.65
(再)20歳以上	13,896	34.1	0.40
年齢調整値	-	35.5	0.42
女性			
20～29	1,381	12.3	0.88
30～39	2,220	11.9	0.69
40～49	2,352	12.7	0.69
50～59	2,494	11.9	0.65
60～69	3,346	8.0	0.47
70以上	4,327	2.9	0.25
(再)20歳以上	16,120	9.0	0.23
年齢調整値	-	9.9	0.26
男女計			
(再)20歳以上	30,016	20.7	0.23
性年齢調整値	-	22.7	0.25

(10) 休養による睡眠がとれていない者の割合

鳥取県（H24国民健康・栄養調査（鳥取県実施分集計結果））

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	32	18.8	6.90
30～39	38	23.7	6.90
40～49	46	28.3	6.64
50～59	49	22.4	5.96
60～69	63	7.9	3.41
70以上	83	9.6	3.24
(再)20歳以上	311	16.7	2.12
年齢調整値	-	18.5	2.34
女性			
20～29	29	41.4	9.15
30～39	43	18.6	5.93
40～49	46	23.9	6.29
50～59	54	20.4	5.48
60～69	71	7.0	3.04
70以上	120	14.2	3.18
(再)20歳以上	363	17.6	2.00
年齢調整値	-	20.6	2.35
男女計			
(再)20歳以上	674	17.2	1.45
性年齢調整値	-	19.6	1.66

全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	1,301	17.4	1.05
30～39	2,060	24.9	0.95
40～49	2,112	25.6	0.95
50～59	2,167	17.0	0.81
60～69	3,001	9.3	0.53
70以上	3,324	6.2	0.42
(再)20歳以上	13,965	15.6	0.31
年齢調整値	-	16.7	0.33
女性			
20～29	1,379	17.9	1.03
30～39	2,225	19.5	0.84
40～49	2,358	22.7	0.86
50～59	2,501	18.0	0.77
60～69	3,358	12.4	0.57
70以上	4,344	9.4	0.44
(再)20歳以上	16,165	15.6	0.29
年齢調整値	-	16.6	0.31
男女計			
(再)20歳以上	30,130	15.6	0.21
性年齢調整値	-	16.6	0.23

(11) 肥満者の割合 (BMI \geq 25)

鳥取県 (H24国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果))

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	21	23.8	9.29
30～39	25	28.0	8.98
40～49	41	34.1	7.41
50～59	32	18.8	6.90
60～69	54	18.5	5.29
70以上	65	15.4	4.48
(再)20歳以上	238	21.8	2.68
年齢調整値	-	22.9	2.96
女性			
20～29	23	17.4	7.90
30～39	29	13.8	6.40
40～49	38	15.8	5.92
50～59	44	18.2	5.81
60～69	70	15.7	4.35
70以上	95	20.0	4.10
(再)20歳以上	299	17.4	2.19
年齢調整値	-	16.8	2.39
男女計			
(再)20歳以上	537	19.4	1.71
性年齢調整値	-	19.9	1.90

全国 (H24国民健康・栄養調査)

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	759	15.2	1.30
30～39	1328	28.0	1.23
40～49	1398	36.6	1.29
50～59	1431	31.6	1.23
60～69	2266	29.6	0.96
70以上	2506	27.3	0.89
(再)20歳以上	9688	29.1	0.46
年齢調整値	-	28.2	0.47
女性			
20～29	819	7.8	0.94
30～39	1573	12.1	0.82
40～49	1737	16.2	0.88
50～59	1935	21.6	0.94
60～69	2774	22.8	0.80
70以上	3235	24.6	0.76
(再)20歳以上	12073	19.4	0.36
年齢調整値	-	17.7	0.35
男女計			
(再)20歳以上	21761	23.7	0.29
性年齢調整値	-	22.9	0.30

(12) やせの割合

鳥取県 (H24国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果))

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	21	19.0	8.57
30～39	25	4.0	3.92
40～49	41	4.9	3.36
50～59	32	3.1	3.08
60～69	54	7.4	3.56
70以上	65	4.6	2.60
(再)20歳以上	238	6.3	1.58
年齢調整値	-	6.9	1.81
女性			
20～29	23	8.7	5.88
30～39	29	6.9	4.71
40～49	38	10.5	4.98
50～59	44	11.4	4.78
60～69	70	14.3	4.18
70以上	95	9.5	3.00
(再)20歳以上	299	10.7	1.79
年齢調整値	-	10.1	1.89
男女計			
(再)20歳以上	537	8.8	1.22
性年齢調整値	-	8.5	1.31

全国 (H24国民健康・栄養調査)

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	759	7.2	0.94
30～39	1328	4.1	0.54
40～49	1398	3.8	0.51
50～59	1431	2.3	0.39
60～69	2266	3.2	0.37
70以上	2506	5.5	0.46
(再)20歳以上	9688	4.2	0.20
年齢調整値	-	4.3	0.23
女性			
20～29	819	21.8	1.44
30～39	1573	17.1	0.95
40～49	1737	11.1	0.75
50～59	1935	8.6	0.64
60～69	2774	8.9	0.54
70以上	3235	9.5	0.51
(再)20歳以上	12073	11.4	0.29
年齢調整値	-	12.7	0.34
男女計			
(再)20歳以上	21761	8.2	0.19
性年齢調整値	-	8.5	0.21

(13) 糖尿病の指摘の状況

鳥取県（H24国民健康・栄養調査（鳥取県実施分集計結果））

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	32	0.0	0.00
30～39	38	2.6	2.60
40～49	47	6.4	3.57
50～59	49	16.3	5.28
60～69	63	22.2	5.24
70以上	80	28.8	5.06
(再)20歳以上	309	15.9	2.08
年齢調整値	-	13.0	1.71
女性			
20～29	29	0.0	0.00
30～39	43	0.0	0.00
40～49	45	4.4	3.07
50～59	54	1.9	1.83
60～69	119	10.1	2.77
70以上	69	21.7	4.97
(再)20歳以上	359	7.0	1.34
年齢調整値	-	6.4	1.14
男女計			
(再)20歳以上	668	11.1	1.21
性年齢調整値	-	9.7	1.03


全国（H24国民健康・栄養調査）

年齢階級 ^{※1}	人数	割合(%)	標準誤差(%)
男性			
20～29	1,305	0.9	0.26
30～39	2,061	2.6	0.35
40～49	2,110	6.3	0.53
50～59	2,171	17.7	0.82
60～69	2,996	24.2	0.78
70以上	3,313	27.1	0.77
(再)20歳以上	13,956	15.3	0.31
年齢調整値	-	13.4	0.26
女性			
20～29	1,379	0.6	0.21
30～39	2,221	1.5	0.26
40～49	2,357	2.5	0.32
50～59	2,497	8.5	0.56
60～69	3,350	14.7	0.61
70以上	4,337	15.7	0.55
(再)20歳以上	16,141	8.9	0.22
年齢調整値	-	7.4	0.19
男女計			
(再)20歳以上	30097	11.9	0.19
性年齢調整値	-	10.4	0.16

2 全国値の換算

平成24年国民健康・栄養調査報告書は全国補正值が掲載されており、割合は単なる人数比とは異なる。

そのため、報告書に掲載されていない年齢区分の割合は、次の換算方法で算出し、本報告書の「結果の概要」のグラフに用いた。



朝食の欠食率

		H24全国	
		男性	女性
総数（1歳以	%	12.8	9.0
20～29歳	%	29.5	22.1
30～39歳	%	25.8	14.8
40～49歳	%	19.6	12.1
50～59歳	%	13.1	9.2
60～69歳	%	7.9	6.5
70歳以上	%	3.9	3.6

H24鳥取県 解析対象者数

男性	女性
23	26
35	34
43	44
47	49
61	69
77	110

H24全国値（換算後）		
	男性	女性
20-39歳	27.3	18.0
40-59歳	16.2	10.6
60歳以上	5.7	4.7

運動習慣がある者の割合

		H24全国	
		男性	女性
総数	%	36.1	28.2
20～29歳	%	27.4	14.0
30～39歳	%	20.8	13.9
40～49歳	%	21.2	18.0
50～59歳	%	27.6	24.5
60～69歳	%	43.2	40.1
70歳以上	%	49.2	36.9

H24鳥取県 解析対象者数

男性	女性
10	11
12	19
24	25
14	32
34	50
49	77

H24全国値（換算後）		
	男性	女性
20-39歳	23.8	13.9
40-59歳	23.6	21.7
60歳以上	46.8	38.2

飲酒習慣がある者の割合

		H24全国	
		男性	女性
総数	%	34.0	7.3
20～29歳	%	14.2	3.3
30～39歳	%	30.8	10.0
40～49歳	%	37.3	13.0
50～59歳	%	45.3	10.4
60～69歳	%	44.2	6.6
70歳以上	%	25.0	2.0

H24鳥取県 解析対象者数

男性	女性
31	29
38	43
46	46
49	53
63	70
82	120

H24全国値（換算後）		
	男性	女性
20-39歳	23.3	7.3
40-59歳	41.5	11.6
60歳以上	33.3	3.7

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合

		H24全国	
		男性	女性
総数	%	14.7	7.6
20～29歳	%	8.2	5.2
30～39歳	%	15.6	10.6
40～49歳	%	19.0	13.4
50～59歳	%	22.6	10.6
60～69歳	%	17.0	6.7
70歳以上	%	6.4	2.0

H24鳥取県 解析対象者数

男性	女性
31	29
38	43
46	46
49	53
63	70
82	120

H24全国値（換算後）		
	男性	女性
20-39歳	12.3	8.5
40-59歳	20.8	11.9
60歳以上	11.0	3.8

現在習慣的に喫煙している者の割合

		H24全国	
		男性	女性
総数	%	34.1	9.0
20～29歳	%	37.6	12.3
30～39歳	%	43.2	11.9
40～49歳	%	43.2	12.7
50～59歳	%	41.0	11.9
60～69歳	%	31.9	8.0
70歳以上	%	16.9	2.9

H24鳥取県 解析対象者数

男性	女性
31	29
38	43
46	45
48	54
62	71
81	116

H24全国値（換算後）		
	男性	女性
20-39歳	40.7	12.1
40-59歳	42.1	12.3
60歳以上	23.4	4.8

睡眠による休養がとれていない者の割合

		H24全国			
		男性		女性	
		あまりと れていな	まったく とれてい	あまりと れていな	まったく とれてい
総数	%	14.3	1.3	14.8	0.8
20～29歳	%	15.3	2.1	17.0	0.9
30～39歳	%	23.1	1.8	18.3	1.2
40～49歳	%	22.1	3.5	21.4	1.3
50～59歳	%	16.0	1.0	17.1	0.9
60～69歳	%	9.1	0.2	11.9	0.5
70歳以上	%	5.8	0.4	8.9	0.5

H24鳥取県
解析対象者数

男性	女性
32	29
38	43
46	46
49	54
63	71
83	120

H24全国値（換算後）		
	男性	女性
20-39歳	21.5	18.9
40-59歳	21.2	20.2
60歳以上	7.5	10.5

肥満・やせの割合

年齢（歳）		H24全国	
		肥満	やせ
男性	総数	29.1	4.2
	20～29歳	15.2	7.2
	30～39歳	28.0	4.1
	40～49歳	36.6	3.8
	50～59歳	31.6	2.3
	60～69歳	29.6	3.2
	70歳以上	27.3	5.5
女性	総数	19.4	11.4
	20～29歳	7.8	21.8
	30～39歳	12.1	17.1
	40～49歳	16.2	11.1
	50～59歳	21.6	8.6
	60～69歳	22.8	8.9
	70歳以上	24.6	9.5

H24鳥取県
解析対象者数

21
25
41
32
54
65
23
29
38
44
70
95

H24全国値（換算後）		
男性	肥満	やせ
20-39歳	22.2	5.5
40-59歳	34.4	3.1
60歳以上	28.4	4.5
女性	肥満	やせ
20-39歳	10.2	19.2
40-59歳	19.1	9.7
60歳以上	23.8	9.2

糖尿病の指摘「あり」の者の割合

		H24全国	
		男性	女性
総数	%	15.3	8.9
20～29歳	%	0.9	0.6
30～39歳	%	2.6	1.5
40～49歳	%	6.3	2.5
50～59歳	%	17.7	8.5
60～69歳	%	24.2	14.7
70歳以上	%	27.1	15.7

H24鳥取県
解析対象者数

男性	女性
32	29
38	43
47	45
49	54
63	119
80	69

H24全国値（換算後）		
	男性	女性
20-39歳	1.8	1.1
40-59歳	12.1	5.8
60歳以上	25.8	15.1

